质子化硼烷正离子体系电子结构的理论研究

戴树珊 方曙*

(云南大学化学系, 昆明 650091)

本文用 ab initio 计算法和近似 ab initio 计算法(PRDDO)研究了质子化硼烷正离子体系的电子结构, 给出了一些正离子体系的优化几何构型并讨论了它们的成键情况。计算的硼烷分子质子亲和势与实验值相当吻合。

关键词: 质子亲和势 电子结构 三中心键 从头计算法

引言

众所周知, 硼烷是一类典型的缺电子化合物, 在化学反应中, 它们具有较强的接受电子而成键的能力。但是 Pierce 等⁽¹⁾的化学电离质谱实验表明, 这些缺电子硼烷也能与缺电子的 H^+ 结合形成质子化的正离子, 呈现出质子亲和性而显一定的碱性。Pierce 等提出了 $B_2H_5^+$ 和 $B_4H_{11}^+$ 体系的可能结构, 见图 1 所示。这些结构正确与否有待理论与实验来检验。虽然

图 1 $B_2H_5^+$ 和 $B_4H_{11}^+$ 的可能结构

Fig.1 Possible structures of $B_2H_5^+$ and $B_4H_{11}^+$

Dekock 等⁽²⁾用半经验分子轨道理论的 MNDO 法对这一问题作了初步研究, 但结果既不完全又非十分满意。为了系统考查质子化硼烷正离子体系的电子结构和成键状态, 揭示其一般规律, 有必要用更严格的量子化学方法来作系统的研究。

方法

使用 Gaussian-80 程序作 $B_2H_5^+$ 、 $B_2H_7^+$ 、 $B_3H_8^+$ 和 $B_3H_{10}^+$ 体系及相应中性分子的 3-21G 几何构型优化, 找到势能面上局部极小点后, 再作 6-31G、6-31G*、6-31G** 和 MP3/6-31G 水平下体系的能量计算和集居分析。对于 $B_4H_{11}^+$ 和 B_4H_{10} 则使用 PRDDO 程序进行几何构型优化, 然后再计算其平衡结构的 HF/3-21G 能量和集居分析。

结果和讨论

1. $B_2H_4/B_2H_5^+$ 体系。 在 B_2H_4 分子的各个可能部位加 H^+ , 对其作几何构型优化, 结果得到三个平衡几何构型, 见图 2 所示。计算的体系总能量总结在表 1 中。由能量可知, B_2H_4 质子化形成了三中心二电子的氢桥键, 三个异构体的稳定次序是 $(2f) > (2c) > (2d)$, 即它们随氢桥键数目的增加其稳定性增强。这一相对稳定性不随基集变化而变, 这意味着极性和电子相关效应不会改变它们的相对稳定性。氢桥键越多体系越稳定是三中心键电子离域程度大, 对正电荷分散有利的反映。表 3 给出了 $B_2H_4(2a)$ 质子化生成 $B_2H_5^+(2c)$ 的质子亲和势。

本文于1988年3月30日收到。

国家自然科学基金资助课题。

* 本校八五级硕士研究生。

图2 B₂H₄ 和 B₂H₅⁺ 的 3-21G 优化几何构型(单位:Å)

Fig.2 3-21G Optimized geometries of B₂H₄ and B₂H₅⁺(unit: Å)

表 1 B₂H₄ 和 B₂H₅⁺ 体系的总能量(-E_{tot},Hartrees)

Table 1 Total Energies of B₂H₄ and B₂H₅⁺ (-E_{tot},Hartrees)

molecules or ions	3-21G	6-31G	6-31G*	6-31G**	MP3/6-31G	FSGO ^a
B ₂ H ₄ (2a)	51.33974	51.61461	51.63459	51.63849	51.73686	
(2b)	51.32028	51.59595	51.61798	51.62176	51.71493	
(2c)	51.25146	51.52199	51.55961	51.56081	51.67653	
B ₂ H ₅ ⁺ (2d)	51.59454	51.87435	51.89778	51.90270	51.99356	43.838
(2e)	51.59568	51.87730	51.91476	51.92251	52.00981	43.879
(2f)	51.60080	51.87857	51.93360	51.94155	52.0224	43.881

Note: Rastogi,R.C. and Ray, N.K., *Intern. J. Quant. Chem.*,11,435(1977).

表 2 B₂H₆ 和 B₂H₇⁺ 的总能量 (-E_{tot},kcal/mol)

Table 2 Total Energies of B₂H₆ and B₂H₇⁺ (-E_{tot},kcal/mol)

molecule or ions	3-21G	6-31G	6-31G*	6-31G**	MP3/6-31G
B ₂ H ₆	32942.5	33116.7	33139.9	33144.6	33216.7
B ₂ H ₇ ⁺ (3b)	33005.6	33181.6	33199.3	33212.7	33283.1
(3c)	33026.3	33206.3	33224.3	33234.2	33301.6
(3d)	33040.3	33218.1	33249.9	33262.2	33326.8
(3e)	33083.1	33260.9	33286.8	33296.6	33362.7

表 3 B₂H₄ 和 B₂H₆ 的质子亲和势 (kcal/mol)

Table 3 Proton Affinities of B₂H₄ and B₂H₆ (kcal/mol)

molecule	3-21G	6-31G	6-31G*	6-31G**	MP3/6-31G	MNDO ^a	exptl ^b
B ₂ H ₄ (2a)	160.6	164.8	175.8	178.2	171.3		
B ₂ H ₆	140.6	144.2	146.9	150.0	146.0	136.6	147±4

note: a. Reference 2; b. Johnson, H.D. et al., *J. Am. Chem. Soc.*, 94, 6711(1972).

2. B₂H₆ / B₂H₇⁺ 体系。B₂H₆ 和 B₂H₇⁺ 的优化几何构型在图 3 中示出。各种近似水平下体系的总能量见表 2。B₂H₇⁺ 各异构体的相对稳定次序是(3e) > (3d) > (3c) > (3b)，这一次序也不随基集变化而变，即(3e)是最稳定的结构。由键长可知，(3e)形成了三中心二电子的 B-H₂ σ 配位键。

可认为它是 $B_2H_5^+-H_2$ 配合物。 $B_2H_7^+(2e)$ 结构与 Pierce 等提出的结构相同，它也许就是质谱中稳定存在的 $B_2H_7^+$ 。表 3 给出的 B_2H_6 的质子亲和势与实验值符合很好。

3. $B_3H_7 / B_3H_8^+$ 和 $B_3H_9 / B_3H_{10}^+$ 体系。 Lipscomb 等对 B_3H_7 和 B_3H_9 等分子作了详细的理论研究^(3,4)。分子束质谱法证实了它们的存在。我们对具有一个氢桥键的环状 B_3H_7 和 $B_3H_9(D_{3h})$ 作了加 H^+ 的几何构型优化，结果没找到相应的稳定的正离子结构。这也许与这些分子本身不稳定有关。

图3 B_2H_6 和 $B_2H_7^+$ 的 3-21G 优化几何构型(单位: Å)

Fig.3 3-21G optimized geometries of B_2H_6 and $B_2H_7^+$ (unit: Å)

图4 B_4H_{10} 和 $B_4H_{11}^+$ 的 PRDDO 优化几何构型(单位 Å)

Fig.4 PRDDO optimized geometries of B_4H_{10} and $B_4H_{11}^+$ (unit: Å)

4. $B_4H_{10} / B_4H_{11}^+$ 体系。 实验给出蝶形的 B_4H_{10} 分子(见图 4 中的 (4a))。其质子化的结构见图 4。相应的体系能量见表 4。 $B_4H_{11}^+$ 各异构体的稳定次序是(4b) < (4c) < (4d) < (4e)，这一稳定性次序与 $B_2H_7^+$ 各异构体稳定性次序一样，不随基集变化而变，即 $B_4H_{11}^+$ 是其中最稳定的正离子。该结构与 Pierce 等提出的结构不同，而是形成了三中心二电子的 B-H₂ σ 配位键，即为 $B_4H_9^+-H_2$ 配合物。 B_4H_{10} 质子化形成 $B_4H_{11}^+$ (4c) 最稳定可由 B_4H_{10} 分子的电子结构得到解释。在 PRDDO 和 HF/3-21G 水平下， B_4H_{10} 的质子亲和势分别为 147.3 和 146.1 kcal/mol，它们与实验值 144 ± 5 kcal/mol 相当吻合。从而表明 $B_4H_{11}^+$ 应为 $B_4H_{11}^+(4e)$ 的结构，而非 Pierce 等提出的结构。链状为 D_{2h} 结构的 B_4H_{10} 分子质子化与 B_2H_6 质子化相似，也生成类

FL

$B_2H_7^+(3e)$ 结构中的三中心二电子的 $B-H_2$ σ 配位键, 这表明结构相似性质相似。

$5.BH_3/BH_4^+$ 体系。Pople 等在 H_2 与简单 Lewis 酸相互作用的 ab initio 计算法研究中较详细地讨论了 BH_4^+ 的结构⁽⁵⁾, 其结果表明, 最稳定的 BH_4^+ 结构为 $[BH_2-H_2]^+$ 配合物。即 BH_3 质子化也将形成较弱的三中心二电子的 $B-H_2$ σ 配位键。

表 4 B_4H_{10} 和 $B_4H_{11}^+$ 体系的总能量 ($-E_g, kcal/mol$)
Table 4 Total Energies of B_4H_{10} and $B_4H_{11}^+$ ($-E_{tot}, kcal/mol$)

molecule or ions	B_4H_{10}	$B_4H_{11}^+(4b)$	$B_4H_{11}^+(4c)$	$B_4H_{11}^+(4d)$	$B_4H_{11}^+(4e)$
PRDDO	65480.5	65593.1	65614.0	65616.8	65627.8
3-21G	65156.3	65275.9	65295.4	65295.7	65302.4

结 论

由上可见, 硼烷质子化将通过形成三中心二电子的 $B-H_2$ σ 配位键或 $B-H-B$ 氢桥键来生成质子化正离子体系。三中心键较经典的二中心二电子键电子离域程度大, 有利正电荷的分散, 能给质子化硼烷正离子提供使其稳定的离域能。这也许是缺电子硼烷呈现质子亲和性的根源。硼烷最有利的质子化部位是其分子电荷最负的部位或分子中对其 HOMO 贡献最大的原子的部位。硼烷质子化后整个结构变形不大, 因此计算的质子亲和势虽未考虑电子相关效应等因素, 但仍与实验结果符合很好。计算表明, B_3H_7 和 B_3H_9 分子质子化将分解, 这可能与它们本身不稳定有关。有关链状 B_3H_7 以及 B_4H_8 、 B_4H_{12} 、 B_5H_9 和 B_6H_{10} 等分子的质子化研究已基本完成⁽⁶⁾, 结果将另文报道。

参 考 文 献

- [1] Pierce, R.C., Porter, R.F., *J. Am. Chem. Soc.*, **95**, 3849(1973).
- [2] Dckock, R.L., Jasperse, C.P., *Inorg. Chem.*, **22**, 3843(1983).
- [3] Mckee, M.L., Lipscomb, W.N., *Inorg. Chem.*, **21**, 2846(1982).
- [4] Mckee, M.L., Lipscomb, W.N., *Inorg. Chem.*, **24**, 2317(1985).
- [5] Pople, J.A. et al., *J. Am. Chem. Soc.*, **92**, 3839(1970).
- [6] 方曙, 云南大学硕士研究生论文, 1988.

THEORETICAL STUDY ON THE ELECTRONIC STRUCTURES OF PROTONATED BORANES

Dai Shushan Fang Shu

(Department of Chemistry, Yunnan University, Kunming 650091)

In this paper, ab initio and / or approximate ab initio calculation M.O. method are used to study the electronic structure of $B_2H_5^+$, $B_2H_7^+$, $B_3H_8^+$, $B_3H_{10}^+$ and $B_4H_{11}^+$. We have discussed the bonded states of protonated boranes and given some of their optimized geometries. The calculated proton affinities for B_2H_6 and B_4H_{10} are in good agreement with experimental values.

Keyword: proton affinity electronic structure three-center bond
 ab initio calculation