含超价硫三元无机杂环化合物的理论研究(I)

刘有德

(云南教育学院化学系,昆明 650031)

马忠新 戴树珊

(云南大学化学系,昆明 650091)

本文应用 *ab initio* 方法,研究了含超价硫化合物分子中硫原子的 $3d$ 轨道的成键作用,并使用 Martagh-Sargent 梯度优化法,预测了该化合物的几何构型.指出硫二氮三元无机杂环中, $d-p\pi$ 键在 S-N 间起重要作用.

关键词: 超价硫 三元杂环 从头计算

硫二氮杂环丙烷-1.1-二氧化物(O_2SN_2RR')具有意外的热稳定性和化学稳定性,且环的稳定性随取代基 R (R')的增大而增加⁽¹⁾,因而引起了人们的注意. Trefonas 等⁽¹⁾用 X-射线衍射研究了该化合物分子的几何构型,给出 N-N 键长为 1.67 Å,这比正常 N-N 单键键长(1.45 Å)大得多.所以探讨这种含超价硫三元杂环化合物的成键机理,有其重要意义.

我们曾用 INDO 方法研究了 $O_2SN_2H_2$ 的几何构型和成键性质⁽²⁾.本文应用 *ab initio* 方法,对该分子的几何构型和成键图象做了进一步的研究,得到较为合理的结果.

由于这类超价硫化合物分子的成键必然涉及硫原子的 $3d$ 轨道,因此在对该化合物进行研究之前,先对为理论化学家们^(3,4)愈来愈感兴趣的硫原子 $3d$ 轨道参与成键的问题做了研究.

方 法

一般说来,分子中参与键合的原子轨道随原子所处的环境而变化,而在 LCAO 近似中原子轨道是保持不变的.二价硫与超价硫相比,其 $3d$ 轨道应有较大的变化.为了考察 $3d$ 轨道在超价硫分子中的作用,本文对 SO_2 分子中 S 的 $3d$ 轨道指数 ζ_d 做了优化,其值为 1.1,它不同于 SF_4 中的数值⁽⁴⁾,这主要是由于 SO_2 分子中的氧原子的电负性较氟的电负性相对地弱, $3d$ 轨道的轨道能量下移相对地少.

由初始 Gauss 基结合(9s6p3d/6s3p)收缩为[3s2p1d/2s1p](基组 I),优化 SO_2 所得到的几何参数列于表 1,并与其他方法的结果和实验值相比较,说明在决定超价硫分子的几何结构中, $3d$ 轨道是起重要作用的.

$O_2SN_2H_2$ 分子是从硫二氮杂环丙烷-1.1-二氧化物分子(O_2SN_2RR'),用 H 原子代替 R (R')基团抽出来的模型分子.在 INDO 给出的结构基础上,应用 Martagh-Sargent 梯度优化法⁽⁶⁾得到了它的几何构型(图 1).硫和两个氮原子构成的三元环平面,与硫和两个氧原子构成的平面相互垂直,属于 C_{2v} 对称性,与 Trefonas 得到的构型一致.在极小基水平上实际上

本文于1988年3月30日收到.

中国自然科学基金资助的课题.

是过高地估计了 d 函数的作用⁽⁷⁾。本文又将 $(9s6p3d/6s3p/3s)$ 初始基函数收缩为 $[4s3p1d/3s2p/2s]$ (基组 II) (相当于分裂价基 3-21G 加 3G 的 $3d$ 函数), 研究了 $(O_2SN_2H_2)$ 分子的成键性质。

本文根据 Mayer 在 *ab initio* 水平上对键级和价指标的定义⁽⁸⁾, 研究了 SO_2 , N_2H_2 和 $O_2SN_2H_2$ 分子的成键图象, 给出的值比较接近经典概念, 比 Mulliken 指标更为直观。

表 1 SO_2 分子的几何结构

Table 1 Geometric Parameters of SO_2

	STO-3G ⁽³⁾	3-21g ⁽³⁾	this work (base I)	exp ⁽⁵⁾
$r_{S-O}(\text{Å})$	1.559	1.526	1.481	1.434
$\alpha_{(OSO)}(^{\circ})$	106.0	114.0	120.6	119.5

图 1 $O_2SN_2H_2$ 分子的优化构型
Fig. 1 Optimized geometry of molecule $O_2SN_2H_2$

全部计算使用 GAUSSIAN 80 程序⁽⁹⁾, 在 HITACHI/M-240D 计算机上完成。

结果与讨论

1. SO_2 分子的电子结构

不少人对 SO_2 分子做过研究⁽³⁻⁴⁾, 我们采用在 S 原子上加 $3d$ 函数(基 I)优化其几何结构。从表 1 可以看出它比 3-21G 给出的结果要好。这表明优化 SO_2 分子的几何结构时加入 d 轨道是十分重要的。

对 SO_2 分子的轨道成键研究(表 2)表明, STO-3G 和 3-21G 都不能正确地预测 PES 谱带序列。但采用基组 I 则能得出相当好的结果; 若采用基组 II 则获得更好的描述, 在 Koopman 定理的基础上, 将轨道能量乘以 Robin 因子 0.92 约等于 PES 谱的值⁽¹⁰⁾。值得注意的是 $4b_1$ 轨道, STO-3G 和 3-21G 两种基都不能得到正确的描述, 加入 $3d$ 轨道后就得到正确的图象。由于 $3d_{yz}$ 轨道处于分子平面上, 能与 O 原子的轨道更好地作用。

表 2 SO_2 分子的分子轨道能级(eV)

Table 2 Energy Levels of Molecule SO_2

MO	[3]			this work		PES	
	STO-3G	3-21G	3-21G*	bases set I	bases set II	cal ^A	exp ⁽³⁾
$8a_1(n_s)$	8.19	12.67	12.93	11.76	13.55	12.47	12.50
$1a_2(\pi_{o-o})$	7.68	12.95	13.39	11.44	14.08	12.95	13.21
$5b_1(n_{o-o})$	9.77	14.22	14.12	13.04	14.92	13.73	13.50
$2b_2(\pi_{o-o})$	15.02	18.28	17.77	16.70	18.27	16.81	(16.30)
$4b_1(a_{o-o})$	14.19	18.16	18.23	17.20	18.82	17.31	16.60
$7a_1(n_{o-o})$	15.27	18.83	18.48	17.74	19.10	17.57	(16.70)

A $0.92 \times$ the results from bases II

SO₂ 分子中 S 原子的 Mulliken 布居分析为 $S^{+0.79}:3s^{1.768}3p^{2.852}3d^{0.717}$ 与 S 的 $3s^23p^33d^1$ 组态相近。

2. O₂SN₂H₂ 分子的电子结构

我们用基组 II 算得 O₂SN₂H₂ 分子的部分分子轨道能级、轨道对称性列于表 3, S 原子的净电荷为 +1.10, Mulliken 布居分析为 $3s^{1.32}3p^{2.51}3d^{1.20}$, 故 O₂SN₂H₂ 分子中 S 原子的组态近似为 $d^1s^1p^2$ 。

O₂SN₂RR' 分子热分解生成 SO₂ 和 RN=NR'。为了探讨 O₂SN₂RR' 分子的形成, 设想模型分子是由 SO₂ 和 HN-NH 分子片环合而成的。对比 O₂SN₂H₂ 与 SO₂ 和 HN-NH 分子优化的结构参数(表 4)看出, S-O 键长和键角 LOSO 基本不变, 而 N-N 键拉长了 0.18 Å, 基本上变成了单键。Trefonas 给出 S-N 键长为 1.62 Å, 与本文优化得到的 1.68 Å 相近。对于 N-N 键长, 人们设定为 1.67 Å, 这远大于标准 N-N 单键键长 (1.45 Å) 和我们优化出的值 (1.44 Å), 即 Trefonas 设定的值实际上是认为 N-N 之间的相互作用要比正常的 N-N 单键还要弱得多; 这与 O₂SN₂RR' 有比较高的稳定性, 以及在加热情况下分解为 SO₂ 和 RN=NR' 的事实相矛盾。

表 3 O₂SN₂H₂ 的分子轨道能级和轨道对称性

Table 3 Energy Levels and Their Symmetries of O₂SN₂H₂

orbital number	symmetry	energy levels(a.u.)	orbital number	symmetry	energy levels(a.u.)	orbital number	symmetry	energy levels(a.u.)
14	8a ₁	-0.9421	18	10a ₁	-0.6488	22	5b ₂	-0.5114
15	9a ₁	-0.7724	19	5b ₁	-0.5649	23	6b ₁	-0.4983
16	4b ₂	-0.7195	20	11a ₁	-0.5321	24	2a ₂	-0.3857
17	4b ₁	-0.6955	21	1a ₂	-0.5197	25	6b ₂	0.1081

表 4 O₂SN₂H₂ 与 SO₂ 和 N₂H₂ 的几何结构参数比较

Table 4 Geometry Parameters Comparison of O₂SN₂H₂ with SO₂ and N₂H₂

	r _{S-O} (Å)	r _{S-N} (Å)	r _{N-N} (Å)	r _{N-H} (Å)	α° (OSO)	α° (HNN)
O ₂ SN ₂ H ₂	1.515	1.683	1.444	1.022	117.2	135.1
SO ₂	1.481				119.5	
N ₂ H ₂			1.264	1.064		111.5
Δ°	0.034		0.180	-0.042	-2.3	23.6

Δ° = difference of r or α in different molecules

对比 O₂SN₂H₂ 与 SO₂ 和 HN=NH 的布居, O 原子上的电荷几乎没有变化, S 原子上的电荷从 +0.79 增加到 +1.10, 即 3s 和 3p 轨道上的布居分别下降了 0.45 和 0.34 个电子, 而 3d 轨道上的布居从 0.72 增加到 1.20 个电子, 主要体现于 3d_{xy} 轨道。这是由于 S 与两个氮成环后, S 原子以 σ 形式给出电子, 而以 π 的方式得到电子 (主要通过 3d 轨道)。由于 S-N 之间的成键, S 原子的 3d 轨道进一步收缩, 更增强了 3d 轨道的成键作用。

为了考察分子的静态性质, 我们应用了 Mayer 的键级和价指标⁽⁹⁾。可以看出, 在 N₂H₂ 中 N-N 间的键级约为 2(1.950)即为双键, 而在 O₂SN₂H₂ 中的 N-N 键级接近于 1(0.904), 应为单键; 但 N 原子的价 (2.88) 几乎不变。在 SO₂ 中, S 的价 (4.6) 和 S-O 键级 (2.3) 均

比通常概念中的 4 价和键级 2 来得大。在 $O_2SN_2H_2$ 中 S 的价为 6.48, 比 SO_2 S 的价增加 2, S-O 键级约为 2 (2.12), S-N 键级为 1。从 Mayer 键级看出, 在 $O_2SN_2H_2$ 中 N-N 键应为一个正常的单键。

图 2 SO_2 N_2H_2 构成 $O_2SN_2H_2$ 的能级关系图
Fig.2 Energy levels correlation diagram of $O_2SN_2H_2$ with SO_2 and N_2H_2

图 2 绘出了 SO_2 与 N_2H_2 构成 $O_2SN_2H_2$ 的能级相关图。在 24 个占据轨道中, $\psi_1-\psi_9$ 基本保持原子轨道的性质; $\psi_{10}-\psi_{13}$ 主要定域在分子的 SO_2 或 N_2H_2 端上, 对分子的形成贡献很少。 $\psi_{14}(8a_1)$ 、 $\psi_{15}(9a_1)$ 、 $\psi_{16}(4b_2)$ 、 $\psi_{17}(4b_1)$ 、 $\psi_{19}(5b_1)$ 、 $\psi_{22}(5b_2)$ 、及 $\psi_{24}(2a_2)$ 轨道在 S 与 N 之间都起成键作用; 而 $\psi_{18}(10a_1)$ 和 $\psi_{23}(6b_1)$ 则起反键作用。 $8a_1$ 与 $10a_1$ 、 $4b_1$ 与 $6b_1$ 基本抵消掉。 $9a_1$ 、 $3b_2$ 和 $4b_2$ 为 S-N 之间的 σ 成键作用, 以 $3b_2$ 的成键作用较强。 $5b_1$ 和 $2a_2$ 为 π 成键作用, 而以 $5b_1$ 成键作用较强, 它是 S 原子的 $3d_{xz}$ 轨道与 N 原子的 $2p_x$ 轨道形成的 $d-p$ π 型轨道, 而 $2a_2$ 则是由于 S 的 $3d_{xy}$ 轨道的作用, 使得 N-N 之间的 π 反键稳定化, 从而使 S-N 间形成 $d-p$ π 键。可以看出, S-N 键虽为单键形式, 但是除 σ 作用外, $d-p$ 形式的 π 轨道也起非常重要的作用。

图 3 轨道相互作用图

Fig.3 Orbital interaction diagrams

参 考 文 献

- [1] Timberlake, J.W. et al., Trefonas, L.M. et al., *J. Am. Chem. Soc.*, **95**, 634,636(1973).
 [2] 刘有德、马忠新, 全国第三届量子化学会议文集, 成都, **B65**, 3(1987).
 [3] Carnovale, F. et al., *J. Chem. Phys.*, **85**, 4304(1986).
 [4] 肖力等, 全国第三届量子化学会议文集, 成都, **B3**, 69(1987).
 [5] Holder, C. H. et al., *J. Chem. Phys.*, **75**, 5323(1981).
 [6] Martagh, B. A., Sargent, R. W. H., *Comput. J.*, **13**, 185(1970).
 [7] Hillier, I. H. et al., *Chem. Phys. Lett.*, **4**, 136(1969).
 [8] Mayer, I., *J. Mol. Struct. (Theochem.)*, **149**, 81(1987).
 [9] Binkley, J. S. et al., *Quantum Chemistry Program Exchange*, **13B**, 406(1981).
 [10] Eland, J. H. D., *Photoelectron Spectroscopy*, Butterworths, Oxford, P 113(1984)

THEORETICAL STUDY OF HYPERVALENT SULFUR CONTAINING THREE-MEMBERED INORGANIC HETEROCYCLIC COMPOUNDS

Liu Youde

(Department of Chemistry, Yunnan Educational Institute, Kunming 650031)

Ma Zhongxin Dai Shusan

(Department of Chemistry, Yunnan University, Kunming 650091)

The hypervalent sulfur containing compound has been studied with *ab initio* method. In comparison, we optimized the exponent(ζ_d) of sulfur in SO_2 and got the value of 1.1, which is different from that in SF_4 (1.25). The geometry of SO_2 has been optimized on the contraction of $[3s2p1d/2s1p]$ (bases set I) and $[4s3p1d/3s2p/2s]$ (bases set II) respectively, both of them are better than the results obtained by using the bases of STO-3G, 3-21G or 3-21G. Compared with the experiment, that indicated the *d* orbital involving is important in the calculation. The multiplication of calculated energy levels with Roothaan formula² we explained the PES of SO_2 .

We adopt $\text{O}_2\text{SN}_2\text{H}_3$ as the model molecule for studying the kind of three-membered heterocyclic molecule $\text{O}_2\text{SN}_2\text{RR}'$. From the population analysis and the correlation diagram of $\text{O}_2\text{SN}_2\text{H}_3$ with SO_2 and HN-NH , we have found that the valence of S in molecule $\text{O}_2\text{SN}_2\text{H}_3$ is 6.48, which increased some about 2 from that in SO_2 . The *d-p* π -bonding play an important role in stabilizing the molecule.

Keywords: hypervalent sulfur three-membered ring *ab initio*