研究简报

线性变位极谱法研究

XII. CAEM 过程二次导数配位吸附不可逆波理论及其验证

吴志斌 张祖训

(南京大学化学系, 南京 210008)

本文提出了 CAEM 过程线性变位二次导数极谱配位吸附不可逆波理论, 并以铜 (II) -L-组氨酸-氢氧化钠体系进行验证, 理论与实验结果相一致。

关键词: 极谱 二次导数配位吸附波

本文在过去工作的基础上^(1,2), 论述了二次导数配位吸附不可逆波理论, 并以铜 (II) -L-组氨酸-氢氧化钠体系进行验证, 理论与实验结果相一致。

理 论

CAEM 电极反应不可逆过程的反应式见文献⁽²⁾式(1)-(3), 其配位吸附不可逆过程常规及导数极谱波方程式为⁽²⁾。

$$i = 0.629 \Psi \Phi = 0.629 a \exp\left[-\frac{anF}{RT}(E - E_p)\right] \cdot \exp\left\{-\exp\left[-\frac{anF}{RT}(E - E_p)\right]\right\} \cdot \frac{n^2 F^2}{RT} v D_0^{1/2} m^{2/3} t_1^{1/6} C_M \quad (1)$$

和

$$i' = \frac{di}{dt} = 0.629 \Phi K_1 \frac{d\Psi}{dt} = 0.629 \Phi K_1 \frac{anFv}{RT} \Psi \{1 - \exp[-anF(E - E_p)/RT]\} \quad (2)$$

式中 K_1 为一次微分电路常数, 导数极谱峰对峰的电流(i'_{pp})以及正峰到负峰之间的电位差(E_{pp})为:

$$i'_{pp} = 0.296 K_1 a^2 n F v \Phi / RT \quad (3)$$

$$E_{pp} = 1.925 RT / anF = 0.0494 / an \text{ V}(25^\circ\text{C}) \quad (4)$$

将式(2)对 t 微分, 得到二次导数配位吸附不可逆波方程式:

$$i'' = 0.629 K_1 K_2 \Phi d^2 \Psi / dt^2 \quad (5)$$

$$d^2 \Psi / dt^2 = (anFv / RT)^2 \Psi \{[1 - \exp(-anF(E - E_p) / RT)]^2 - \exp[-anF(E - E_p) / RT]\} \quad (6)$$

式中 K_2 为二次微分电路常数, 利用微分法对式 (6) 可求得三个极值点的

本文于1989年3月14日收到。
国家自然科学基金资助项目。

$\exp[-\alpha nF(E-E_p)/RT]$ 之值分别为 0.1658, 1.3434, 4.491. 代入式(5)(6)可得三个峰电流的表达式为:

$$i''_{p(1)} = 0.04684K_1K_2\alpha^3(nFv/RT)^2\Phi \quad (7)$$

$$i''_{p(2)} = -0.2702K_1K_2\alpha^3(nFv/RT)^2\Phi \quad (8)$$

$$i''_{p(3)} = 0.2437K_1K_2\alpha^3(nFv/RT)^2\Phi \quad (9)$$

由上述各式可得到以下结果:

$$i''_{pp(1,2)} = i''_{p(1)} - i''_{p(2)} = 0.317K_1K_2\alpha^3(nFv/RT)^2\Phi \quad (10)$$

$$i''_{pp(3,2)} = i''_{p(3)} - i''_{p(2)} = 0.514K_1K_2\alpha^3(nFv/RT)^2\Phi \quad (11)$$

$$E''_{pp(1)} = |E_p(1) - E_p(2)| = 2.092RT/\alpha nF \quad (12)$$

$$E''_{pp(2)} = |E_p(3) - E_p(2)| = 1.207RT/\alpha nF \quad (13)$$

$$i''_{pp(1,2)}/i'_{pp} = 1.07\alpha nFvK_2/RT \quad (14)$$

$$i''_{pp(3,2)}/i'_{pp} = 1.74\alpha nFvK_2/RT \quad (15)$$

$$i''_{p(2)}/i'_{pp} = -0.913\alpha nFvK_2/RT \quad (16)$$

由式(1)(2)(5)表示的极谱波见图 1 曲线 a、b、c.

图 1 Cu(II)-His 配位吸附波

Fig.1 Cu(II)-His adsorptive complex wave $[Cu^{2+}] = 1.64 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$, $[His] = 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ $v = 0.250 \text{ V/s}$, $m = 0.236 \text{ mg/s}$, $t_1 = 6.00 \text{ s}$
 (a) normal curve, (b) derivative curve, (c) second derivative curve
 —experimental,theoretical

实 验

一、仪器和试剂: 使用的仪器和实验方法同文献⁽²⁾, Cu(II)标准液用纯金属按常规方法配制. 组氨酸溶液按文献⁽³⁾制备, 其余试剂均为分析纯.

二、结果:

1. 常规极谱和一次导数不可逆波: 对式(1), 文献⁽²⁾已作过验证. 用本文体系对式(1)验证, 理论与实验也相符(图 1a), 求得 $\alpha = 0.63$, $D_0 = 3.20 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}$. 文献⁽²⁾仅

验证了式(2)中电流与各参量的关系。用本文体系验证结果见图 1b, K_1 测定方法见文献⁽¹⁾, 结果为 0.163.

2. 二次导数不可逆波: 实验结果见图 1c, 除峰 (3) 因受残余电流影响与理论曲线稍有偏离外, 其余部分均与理论曲线吻合。我们认为这并不影响对理论正确性的证实。 K_2 的测定值为 0.0809。实验结果还表明, i''_{pp} 与 $[Cu(II)]$, $m^{2/3}$, v^3 呈直线关系, $\lg i''_{pp}(1,2)$ 与 $\lg t_1$ 之间也为直线关系, 其斜率为 1.16 与理论相符。还测定了不同浓度的 $i''_{pp}(1,2)$, $i''_{pp}(2)$ 与 i''_{pp} 的比值, 与按式 (14) - (16) 计算值相符 (表 1)。综上所述本文理论已得到较好地证实。

表 1 (Cu(II)) 与峰电流的关系
Table 1 Relationship between [Cu(II)] and Peak Current

[Cu(II)] mol/l	i''_{pp} $\mu A/s$	$i''_{p(2)}$ $\mu A/s^2$	$i''_{pp(1,2)}$ $\mu A/s^2$	$i''_{p(2)}/i''_{pp}$			$i''_{pp(1,2)}/i''_{pp}$		
				experimental	average	calculated	experimental	average	calculated
1.23×10^{-6}	0.0850	-0.0760	0.090	-0.894	-0.904	-0.902	1.06	1.05	1.06
2.05×10^{-6}	0.160	-0.145	0.165	-0.906			1.03		
4.10×10^{-6}	0.330	-0.300	0.350	-0.909			1.06		
8.20×10^{-6}	0.640	-0.580	0.665	-0.906			1.04		
1.64×10^{-5}	1.240	-1.120	1.300	-0.903			1.05		

参 考 文 献

- (1) 张祖训、屠一锋, 高等学校化学学报, 6, 403 (1985).
 (2) 甘知行、陈莉莉、曹广荻、张祖训, 化学学报, 47, 78 (1989).
 (3) Kruck, T. P. A., Sarkar, B., *Can. J. Chem.*, 51, 3549 (1973).

INVESTIGATIONS ON POLAROGRAPHY WITH LINEARLY CHANGING POTENTIAL

XII. ON THE THEORY FOR THE SECOND DERIVATIVE ADSORPTIVE-COMPLEX IRREVERSIBLE WAVE WITH CAEM MECHANISM

Wu Zhibin Zhang Zuxun

(Department of Chemistry, Nanjing University, Nanjing 210008)

In this paper, the theory of the second derivative adsorptive-complex wave with CAEM mechanism is described. Experiments were carried out on JP-2 type oscillopolarograph. The theoretical conclusions are in good agreement with experimental data for the reduction of Cu(II) in $0.2 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ NaOH} - 0.001 \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3} \text{ L-histidine}$ solution.

Keywords: polarography second derivative adsorptive-complex wave