2,6—二乙酰吡啶类双希夫碱配合物的研究

III. Co(II)、Ni(II)、Zn(II)、Pb(II)

和 Cd(II) 配合物的合成和表征

耿志明· 韩志坚 戴寰

(南京大学化学系, 南京 210008)

制备了由 2,6—二乙酰吡啶和胍基硫代甲酸酯衍生的希夫碱 $C_6H_7N[CH=NNHC(S)XR]_2$ ($X=S, R=CH_3, C_6H_5CH_2$; $X=O, R=C_6H_5CH_2$), 离析出类型为 $MC_6H_7N[CH=NN=C(S)XR]_2$ ($M=Co^{2+}, Ni^{2+}, Zn^{2+}, Pb^{2+}$ 和 Cd^{2+}) 的希夫碱配合物。配合物为元素分析、红外、可见—紫外光谱以及磁化率测量所表征。结果指出: 上述希夫碱均为 N_2S_2 型五齿配体。

关键词: 2,6—二乙酰吡啶 希夫碱 配合物 钴 镍 锌 铅 镉

前 言

2,6—二乙酰吡啶(简称 DAP), 其 2,6 位上的两个羰基与吡啶环相连, 可形成大 π 共轭体系而具有活性, 很容易与伯胺进行缩合形成希夫碱。以 DAP 作为母体的含硫双希夫碱配体, 由于吡啶环上存在着配位能力极强的氮原子, 以及硫原子在极化、价态、 π 成键等方面的特殊性, 而越来越受到人们的重视。我们已在文献^[1]中报道了利用 1 摩

DAP 与 2 摩胍基硫代甲酸酯通过“2+1”缩合, 首次合成并表征了 2,6—二乙酰吡啶缩胍基硫代甲酸酯双希夫碱及其 VO(II)、Mn(II)、Fe(II) 和 Fe(III) 的配合物。

本文合成了 H_2L^1 、 H_2L^2 及 H_2L^3 的 Ni(II)、Co(II)、Zn(II)、Pb(II) 及 Cd(II) 的配合物, 并利用元素分析、红外光谱、紫外—可见光谱及磁化率等对它们进行了表征。

实验部分

一. 配体的合成: 配体按文献^[1]中的方法合成。

二. 配合物的合成:

CoL^1 : 称取 0.5mmol H_2L^1 于 100ml 锥形瓶中, 加入 0.5mmol 的 $Co(Ac)_2 \cdot 2H_2O$ 的 25ml 乙醇溶液, 回流搅拌 6~7 小时, 冷却, 过滤, 用 20ml 水、20ml 乙醇各洗涤一次, 整个过程在氮气保护下进行, 产品于 P_2O_5 真空干燥器中干燥。

本文于1989年5月30日收到。

• 现在江苏省农科院工作。

CoL²、CoL³按相同方法合成。

NiL¹、NiL²、NiL³用 NiCl₂·6H₂O, ZnL¹、ZnL²、ZnL³用 Zn(Ac)₂·2H₂O, PbL¹、PbL²用 Pb(Ac)₂·2H₂O, CdL¹、CdL²用 Cd(Ac)₂·2H₂O, 分别按类似 CoL¹的合成方法合成。

三.测试:

C、H、N含量以及红外光谱分别用 Perkin Elmer 240C 元素分析仪和 NICOLET-170 SXFT 红外谱仪测试。紫外—可见光谱用 SHIMADZU UV-240 紫外—可见分光光度计测试。磁化率用 CTP-F82 法拉第磁天平测得。金属含量用 RL-PLASMA 200 ICP 等离子发射光谱仪测试。

结果与讨论

一.化合物的组成: 希夫碱及其配合物分析数据见表1。

表1 希夫碱及其配合物的分析数据

Table 1 Analytical Data for Schiff Bases and Their Complexes

compound	color	% found				% calcd.			
		C	H	N	M	C	H	N	M
CoL ¹	dark brown	36.08	3.11	16.09	13.43	36.44	3.53	16.34	13.75
NiL ¹	brown	36.45	3.38	16.77	13.93	36.45	3.53	16.35	13.70
ZnL ¹	light yellow	36.27	3.45	15.99	14.85	35.90	3.44	16.10	15.03
CdL ¹	yellowish orange	32.76	3.08	14.59		32.39	3.14	14.53	
PbL ¹	yellowish orange	26.44	2.28	11.93		27.05	2.60	12.14	
CoL ²	brown	51.54	3.64	11.96	9.67	51.66	4.00	12.06	10.14
NiL ²	brown	52.22	3.52	12.23	9.71	51.74	4.00	12.07	10.11
ZnL ²	light yellow	50.76	3.73	11.64	10.88	51.09	3.96	11.93	11.14
CdL ²	yellowish orange	46.65	3.33	10.61		46.47	3.59	10.84	
PbL ²	yellowish orange	41.40	2.83	9.39		41.40	3.15	9.63	
CoL ³	brown	54.53	4.18	12.58	10.34	54.74	4.24	12.77	10.74
NiL ³	brown	54.37	4.06	12.59	10.64	54.53	4.23	12.70	10.71
ZnL ³	light yellow	53.78	4.07	12.25	11.57	54.09	4.18	12.62	11.78

二.红外光谱

配体 H₂L¹、H₂L²、H₂L³ 的红外光谱在文献⁽¹⁾中都已作过详细讨论。

三个配体的配合物在 3100~3200cm⁻¹ 区域均没有出现 ν_{N-H} 振动吸收, 表明配合物的形成过程即是配体的 N² 上的去质子化过程⁽²⁾。

H₂L¹ 的配合物的 ν_{C=N} 在 1585~1595cm⁻¹ 之间, 比配体的 ν_{C=N} 向低波数方向移动了 10~20cm⁻¹, 表明 N 原子参加配位。硫代酰胺-II、-III、-I 和 -IV 振动频率分别是 1440~1470、1260~1270、1045~1050 和 802~810cm⁻¹, 其中 ν_{C=S} 有最大贡献的 -III 的吸收强度被大大削弱, -I 的振动频率向低波数方向移动了 10~30cm⁻¹, 表明硫原子参加了配位⁽³⁾。吡啶环的三个振动(环变形、平面中环变形和平面外环变形) 振动频率分别为 1570~1577、620~

625 和 423~440cm⁻¹, 后两个振动频率向高波数方向移动了 5~20cm⁻¹, 表明吡啶上 N 原子参加了配位⁽⁴⁾。ν_{M-N}、ν_{M-S} 和 ν_{M-N(S)} 分别被标识为 367~376、310~332 和 263~275 cm⁻¹ (5,6)。

H_2L^2 配合物的 ν_{C-N} 为 $1595\sim 1599cm^{-1}$, 较配体的 ν_{C-N} 向低波数方向移动了 $5\sim 10cm^{-1}$. 硫代酰胺-Ⅱ、-Ⅲ、-Ⅰ和-Ⅳ分别为 $1450\sim 1453$ 、 $1251\sim 1261$ 、 $1032\sim 1050$ 和 $794\sim 808cm^{-1}$. -Ⅲ的吸收强度被大大削弱, -Ⅰ振动频率向低波数方向移动了 $10\sim 30cm^{-1}$; 吡啶环的三个振动分别是 $1572\sim 1589$ 、 $624\sim 634$ 和 $412\sim 416cm^{-1}$. ν_{M-N} 、 ν_{M-S} 和 $\nu_{M-N(py)}$ 分别为 $352\sim 370$ 、 $302\sim 320$ 和 $254\sim 270cm^{-1}$.

H_2L^3 配合物的 ν_{C-N} 为 $1598\sim 1602cm^{-1}$, 较配体的 ν_{C-N} 向低波数方向移动了 $\sim 10cm^{-1}$, 硫代酰胺-Ⅱ、-Ⅲ、-Ⅰ和-Ⅳ分别为 $1440\sim 1455$ 、 $1250\sim 1260$ 、 $1020\sim 1030$ 和 $808\sim 815cm^{-1}$, -Ⅲ的吸收强度被削弱, -Ⅰ的振动频率向低波数方向移动了 $15\sim 20cm^{-1}$; 吡啶环的振动频率分别是 1580 、 $625\sim 637$ 和 $420\sim 422cm^{-1}$; ν_{M-N} 、 ν_{M-S} 和 $\nu_{M-N(py)}$ 分别是 $375\sim 388cm^{-1}$ 、 $320\sim 329$ 和 $275\sim 280cm^{-1}$.

H_2L^3 配合物在 $1200cm^{-1}$ 左右出现 $1\sim 2$ 个吸收峰, 标识为 δ_{C-O-R} ⁽⁵⁾; 而 H_2L^1 、 H_2L^2 配合物在 $745\sim 780cm^{-1}$ 区域出现一个吸收峰, 标识为 ν_{C-S} ⁽⁵⁾.

我们发现 $Cd(II)$ 和 $Pb(II)$ 配合物的 ν_{N-N} 较相应的配体及 $Co(II)$ 、 $Ni(II)$ 等第一过渡系列金属配合物的 ν_{N-N} 要低, 配体 H_2L^1 、 H_2L^2 的 ν_{N-N} 为 $952\sim 958cm^{-1}$ ⁽⁶⁾, 其第一过渡系列金属配合物的 ν_{N-N} 为 $960\sim 965cm^{-1}$, 而 $Cd(II)$ 和 $Pb(II)$ 配合物的 ν_{N-N} 为 $940\sim 950cm^{-1}$. 我们认为: 这与 $Cd(II)$ 、 $Pb(II)$ 与 $Co(II)$ 等第一过渡系列金属离子在电子构型方面的不同是有关系的. $Co(II)$ 等第一过渡系列金属离子的电子构型为 $[Ar]3d^n(n=1\sim 9)$, 与配体形成配合物时, 配体以 N_3S_2 与金属离子形成五齿螯合物, 使 N^1 上的电子密度降低, 同时中心离子的 $3d$ 电子与配体的共轭双键及硫原子上的空 $3d$ 轨道形成离域大 π 键, 使 N^1-N^2 之间的电子密度增大. 形成配合物后总效应是使 $\nu_{N^1-N^2}$ 频率增高. $Cd(II)$ 、 $Pb(II)$ 的电子构型是 $[Kr]4d^{10}$ 和 $[Xe]4f^{14}5d^{10}6p^2$, 它们的 d 电子不能与配体形成螯合环内的离域大 π 键, 所以其配合物的 $\nu_{N^1-N^2}$ 较配体和 $Co(II)$ 、 $Ni(II)$ 等第一过渡系列配合物的 $\nu_{N^1-N^2}$ 低.

表 2 希夫碱及其配合物的红外光谱数据

Table 2 IR Data for Schiff Bases and Their Complexes

assignment compound	ν_{C-N}	ν_{N-N}	ν_{C-N}			ν_{N-N}	ν_{C-S}			ν_{M-N}	ν_{M-S}	$\nu_{M-N(py)}$	δ_{C-O}	
			(Ⅱ)	(Ⅲ)	(Ⅰ)		(Ⅳ)	ν_{C-S}	ν_{C-S}					
CoL^1	1593w	1572w	1470s	1260w	1046s	962s	807s	745m	626w	440w	376w	332w	270w	
NiL^1	1593w	1570w	1450s	1264w	1050s	962s	802m	750w	625w	423w	371w	309w	275w	
ZnL^1	1595w	1577s	1460s	1270w	1045s	967s	810m	750m	626w	440w	370w	313w	258w	
CdL^1	1592w	1570s	1462s	1260w	1055s	950s	809s	765w	626w	427w	367w	317w	264w	
PbL^1	1585w	1560m	1440m	1260w	1050s	946s	808m	740m	620w	440w	370w	310w	263w	
CoL^2	1595w	1598w	1451s	1257w	1045s	960s	794s	775w	634w	413w	360w	320w	270w	
NiL^2	1599w	1583w	1453m	1251w	1045s	958s	804m	765w	630w	413w	370w	310w	273w	
ZnL^2	1597w	1572w	1452s	1261w	1032s	956s	808s	767w	622w	412w	364w	302w	271w	
CdL^2	1595w	1572m	1450s	1258w	1050s	945s	804m	780w	634w	414w	362w	318w	254w	
PbL^2	1596w	1586w	1452s	1251w	1042s	943s	807s	774m	633w	416w	352w	318w	254w	
CoL^3	1600w	1580w	1455m	1250w	1030m	910m	808s		630w	420w	388w	329w	283w	120
NiL^3	1598w	1580w	1455s	1260m	1025m	910m	810s		625w	422w	380w	326w	280w	121
ZnL^3	1602w	1580w	1440s	1260m	1020m	910m	815m		637w	420w	375w	320w	275w	120

s: strong; m: medium; w: weak

三.紫外—可见光谱:

有关数据见表3. 配体 H_2L^1 、 H_2L^2 、 H_2L^3 的紫外—可见光谱在文献⁽¹⁾中已作过讨论. 配合物在 263~300nm、315~355nm 和 360~435nm 之间的吸收峰分别是配体的 $n \rightarrow \sigma^*$ 、 $\pi \rightarrow \pi^*$ 和 $n \rightarrow n^*$ 电子跃迁吸收. NiL^2 和 CoL^3 在 570~640nm 处的吸收峰, 根据其强度, 我们认为为 M-L 电荷迁移吸收峰.

四.磁化率

配合物的磁化率列于表3. Co(II) 配合物有 3 个单电子, 中心离子呈高自旋态; Ni(II) 配合物表现为抗磁性, 表明 Ni(II) 的 8 个 d 电子全部成对, 处于低自旋态; Cd(II)、Pb(II)、Zn(II) 配合物皆为抗磁性, 与它们的电子构型相符.

表3 希夫碱及其配合物的磁化率和紫外—可见光谱

Table 3 Magnetic Susceptibilities* and UV-Visible Spectra**

Data for Schiff Bases and Their Complexes

compound	μ_{eff} B.M.	λ_{max} ($\epsilon: l \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$)
CoL^1	4.40	268(1.9×10^4), 300(1.8×10^4), 580(1.7×10^3)
NiL^1	diamagnetism	292(1.4×10^4), 325(2.1×10^4)
ZnL^1	diamagnetism	263(1.3×10^4), 318(3.4×10^4), 352(2.4×10^4), 412(9.3×10^3)
CdL^1	diamagnetism	267(3.1×10^3), 317(5.0×10^3), 357(2.1×10^3), 423(1.6×10^3)
PbL^1	diamagnetism	265(2.5×10^3), 315(3.8×10^3), 360(2.5×10^3), 420(1.1×10^3)
CoL^2	4.62	285(1.1×10^4), 343(1.7×10^4), 495(3.0×10^3)
NiL^2	diamagnetism	295(2.8×10^4), 313(2.6×10^4), 345(2.3×10^4), 388(1.6×10^4), 640(4.8×10^3)
ZnL^2	diamagnetism	297(2.9×10^4), 355(2.1×10^4), 363(1.1×10^4), 410(8.2×10^3)
CdL^2	diamagnetism	270(3.2×10^3), 340(4.0×10^3), 360(3.0×10^3), 420(1.0×10^3)
PbL^2	diamagnetism	263(5.2×10^3), 275(5.4×10^3), 287(7.2×10^3), 412(2.0×10^3), 432(2.1×10^3)
CoL^3	4.30	267(3.1×10^4), 274(3.0×10^4), 282(2.3×10^4), 435(1.0×10^4), 570(2.0×10^3)
NiL^3	diamagnetism	263(3.2×10^4), 320(2.4×10^4), 365(1.7×10^4)
ZnL^3	diamagnetism	264(3.9×10^4), 335(2.9×10^4), 400(2.7×10^3)

* temperature: 25°C; standard sample: $Fe(NH_4)_2SO_4 \cdot 6H_2O$; ** solvent: DMF; concentration: $10^{-4} \sim 10^{-5} mol \cdot l^{-1}$

参 考 文 献

- (1) 戴寰、耿志明、韩志坚, 无机化学, 5(3) 73-79 (1989).
- (2) Dissouky, A. et al., *Synth. React. Inorg. Met-org. Chem.*, 16, 1035(1986).
- (3) Sengupta, S.K., Kumer, S., *ibid*, 13, 929(1983).
- (4) Dashora, R., Singh, R.V., *ibid*, 13, 209(1983).
- (5) 中西香尔, 索罗曼, P.H., 红外光谱分析 100 例, 王绪明译, 科学出版社, (1984).
- (6) 中本一雄, 无机和配合物红外和拉曼光谱, 黄德如等译, 化学工业出版社, (1986).

STUDIES ON COMPLEXES OF SCHIFF BASES
DERIVED FROM 2,6-DIACETYLPIRIDINE

III. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION

OF Co(II), Ni(II), Zn(II), Pb(II) AND Cd(II) COMPLEXES

Geng Zhiming Han Zhijian Dai Huan

(Department of Chemistry, Nanjing University, Nanjing 210008)

The Schiff bases 2,6-C₅H₃N(CH=NNHC(S)XR)₂ (where X=S, R=CH₃, C₆H₅CH₂; and X=O, R=C₆H₅CH₂) derived from 2,6-diacetylpyridine and dithiocabazate have been prepared. Complexes of the Schiff bases of the type MC₅H₃N(CH=NN=C(S)XR)₂ (M=Co²⁺, Ni²⁺, Zn²⁺, Pb²⁺ and Cd²⁺) have been isolated. The complexes were characterized by elemental analysis, infrared and visible-ultraviolet spectroscopy and magnetic susceptibility measurements. The results denote that the Schiff bases are penta-dentate ligands of N₃S₂-type.

Keywords: 2,6-diacetylpyridine Schiff base complex compound
cobalt nickel zinc lead cadmium