研究简报

四苯硼酸盐的热化学研究

II. 一价四苯硼酸盐的标准生成焓

张忠海

邹立壮

(湖北孝感师专, 孝感 431200)

(山东聊城师院, 聊城 252000)

徐桂端

屈松生

(武汉大学 化学系, 武汉 430072)

本文用自行建立的精密溶解量热装置测定了 298.15K 时, NH_4BPh_4 、 KBPh_4 、 RbBPh_4 、 CsBPh_4 、 TlBPh_4 、 AgBPh_4 和 HgPh_2 七种沉淀反应的反应焓, 由此计算了一价四苯硼酸盐的标准生成焓、嫡及吉布斯自由能。

关键词: 四苯硼酸盐 热化学 反应焓 标准生成焓

实验及结果

试剂: 四苯硼钠、氯化钾、氯化铷、氯化铯、氯化亚铊、硝酸银、硝酸汞均为分析纯试剂; HAc-NaAc 缓冲溶液 ($\text{pH} \approx 5$) $0.1\text{mol} \cdot \text{l}^{-1}$; 硝酸汞缓冲溶液 ($\text{pH} \approx 5$) $0.01069\text{mol} \cdot \text{l}^{-1}$; EDTA 溶液 $0.02396\text{mol} \cdot \text{l}^{-1}$ 。

仪器及操作: 本实验室自行建立的恒温外壳精密溶解热热量计, 该仪器用光谱纯 KCl 标定, 测量精度达 $\pm 0.09\%$; 用美国 NBS 提供的 TRIS 鉴定, 测量结果与文献值吻合。实验操作同文献[1]。

反应焓的测定及结果计算:

(1) NaBPh_4 在水中溶解焓的测定:

准确称取约 2g NaBPh_4 , 320.00g 二次蒸馏水, 溶解末态 $\text{NaBPh}_4 : \text{H}_2\text{O} = 1 : 3000$ (摩尔比)。结果见表 1。

表 1 NaBPh_4 在纯水中(1:3000)的溶解焓(298.15K, 1atm)

Table 1 Solution Enthalpy of NaBPh_4 in Pure Water (1:3000)

No	W_{NaBPh_4} (g)	$\theta(\Omega \cdot \text{g}^{-1})$	$\bar{E}(\text{J} \cdot \Omega^{-1})$	$\Delta H_s(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$
1	2.0035	149.4	0.3799	-19.42
2	2.0104	149.4	0.3799	-19.42
3	1.9919	150.2	0.3799	-19.52
4	2.0112	150.4	0.3799	-19.55

$$\Delta \bar{H}_s = -19.47 \pm 0.08 \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

(2) $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ 与 NaBPh_4 反应焓的测定: 根据反应[2]

本文于1989年7月21日收到。

• 通讯联系人。

准确称取约 2g 晶体 NaBPh_4 为沉淀剂, 321.00g $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ 水溶液为量热物质, NaBPh_4 : $\text{H}_2\text{O} = 1:3000$ (摩尔比), 测定反应 (a) 的反应焓。计算结果以 NaBPh_4 为基准, 而 NaBPh_4 过量, 应对 NaBPh_4 未参与反应的部分扣除。结果见表 2。

表 2 $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$ 与 NaBPh_4 之反应焓(298.15K, 1atm.)Table 2 Enthalpy of Reaction NaBPh_4 with $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$

No.	W_{NaBPh_4} (g)	$W_{\text{Hg}(\text{NO}_3)_2}$ (g)	σ_{NaBPh_4}	$\Delta H_{\text{r}}(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	$\Delta H_{\text{r}}(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$
1	0.6887	0.9378	0.6411	-221.50	-341.98
2	0.6887	0.9164	0.6411	-226.24	-342.00
3	0.6887	0.9238	0.6359	-224.71	-342.00
4	0.6603	1.0059	0.5577	-198.65	-340.77
5	0.6603	0.9920	0.5678	-202.78	-342.32

$$\overline{\Delta H_{\text{r}}} = -341.85 \pm 0.56 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

notes: (1) σ_{NaBPh_4} is mole fraction of NaBPh_4 reacted;

(2) ΔH_{r} is reaction enthalpy uncorrected for reaction percentage.

根据方程式(a), 借助于其他相关物质的 ΔH_f° (见表 3), 计算了 NaBPh_4 晶体的 ΔH_f° (表 5)。

表 3 辅助数据表(298.15K, 1atm)($M_n Y_n: \text{H}_2\text{O} = 1:3000 \text{ mol}$)

Table 3 Table of Adjutant Data

compound	NaCl	NaNO_3	HNO_3	$\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$	H_3BO_3	H_2O	HgPh_2
ΔH_f° ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	-406.88	-446.04	-206.31	-242.67	-1067.76	-285.84	-280.75
compound	NH_4Cl	KCl	RbCl	CsCl	TlCl	AgNO_3	
ΔH_f° ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)	-300.07	-418.11	-413.61	-414.88	-100.67	-105.50	
ion	NH_4^+	K^+	Rb^+	Cs^+	Tl^+	Ag^+	
$S_f^\circ(M^+, \text{aq})^a$	112.84	102.50	124.30	133.11	127.20	73.93	
compound	NH_4BPh_4	KBPh_4	RbBPh_4	CsBPh_4	TlBPh_4	AgBPh_4	
$\text{p}K_{\text{sp}}^\circ(\text{in H}_2\text{O})^d$	7.08	7.52	8.53	8.75	9.92	17.20	

note: (1) a see [7]; b is solid state, see [8]; c see [7]; d see [9].

(2) $H_f^\circ(\text{aq})$ is marked with *.

(3) MBPh_4 沉淀反应焓的测定:

根据下列反应 $\text{MCl}(\text{aq}) + \text{NaBPh}_4(\text{c}) = \text{MBPh}_4(\text{c}) \downarrow + \text{NaCl}(\text{aq}) \quad (\text{b})$

$\text{AgNO}_3(\text{aq}) + \text{NaBPh}_4(\text{c}) = \text{AgBPh}_4(\text{c}) + \text{NaNO}_3(\text{aq}) \quad (\text{c})$

分别以 MCl 及 AgNO_3 的水溶液为量热物质, 上述盐一般过量约 30%, NaBPh_4 用量为 1.6~2g, 水量为 320.00g 实验结果见表 4。

以 NaBPh_4 为基准计算了 MBPh_4 沉淀反应焓, 并根据各沉淀物质 25℃ 时的 K_{sp} (见表 3) 计算了其 $\Delta G_{\text{r}}^\circ$, $\Delta S_{\text{r}}^\circ$ 。

我们根据沉淀体系的离子强度(约 0.02)及 pH 值计算得到各沉淀体系中残留的 BPh_4^- 离子浓度在 $10^{-6} \sim 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{l}^{-1}$ 范围, 可以认为沉淀反应进行基本上是完全的。

根据表 4 所得到的 $\Delta H_{\text{r}}^\circ$, 结合反应 (b)、(c) 分别计算了各 MBPh_4 的 ΔH_f° ; 并由已知的 NH_4BPh_4 , KBPh_4 , RbBPh_4 (3) 的 S_f° , 结合相关反应 $\text{M}^+(\text{aq}) + \text{BPh}_4^-(\text{aq}) = \text{MBPh}_4(\text{c})$ 的 $\Delta S_{\text{r}}^\circ$, 计算得到 BPh_4^- 的标准生成焓平均值为 $\overline{S_f^\circ}(\text{Bph}_4^-, \text{aq}) = 322.14 \text{ J mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$; 再结合相

关离子的 $S_f^0(M^+,aq)$ 得到了 $CsBPh_4$ 、 $TiBPh_4$ 、 $AgBPh_4$ 的 $S_f^0(MBPh_4)$ ，进而计算了六种 $MBPh_4$ 晶体的 $\Delta G_f^0(MBPh_4)$ 。计算结果见表 5。

表 4 $M^+ + BPh_4^- = MBPh_4$ 反应的热力学函数(298.15K, 1atm)

Table 4 Thermodynamical Function of Reaction $M^+ + BPh_4^- = MBPh_4$

ion	$\Delta H_f^0(kJ \cdot mol^{-1})$	$\Delta H_R^0(kJ \cdot mol^{-1})$	$\Delta G_R^0(kJ \cdot mol^{-1})$	$\Delta S_R^0(kJ \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$
NH_4^+	-51.17 ± 0.12	-31.70 ± 0.20	-40.41	29.21 ± 0.40
K^+	-57.71 ± 0.19	-38.24 ± 0.27	-42.94	15.76 ± 0.63
Rb^+	-68.72 ± 0.14	-49.31 ± 0.22	-48.72	-1.98 ± 0.47
Cs^+	-71.75 ± 0.25	-52.28 ± 0.33	-49.95	-7.81 ± 0.84
Tl^+	-90.51 ± 0.38	-71.04 ± 0.46	-56.60	-48.43 ± 1.27
Ag^+	-103.99 ± 0.34	-84.52 ± 0.42	-98.17	-45.78 ± 1.11

notes: (1) ΔH_f^0 is reaction enthalpy of crystal $NaBPh_4$; (2) ΔH_R^0 is enthalpy of reaction between ions after correction for solution enthalpy of $NaBPh_4$; (3) K_{sp} quoted in calculation see table 3.

表 5 $MBPh_4(c)$ 标准生成热力学函数(298.15K, 1atm)

Table 5 Standard Thermodynamical Function of Formation of $MBPh_4(c)$

compound	$\Delta H_f^0(kJ \cdot mol^{-1})$	$\Delta G_f^0(kJ \cdot mol^{-1})$	$\Delta S_f^0(J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1})$
$NaBPh_4$	-1009.50		
NH_4BPh_4	-953.87	-1090.22	457.31°
$KBPh_4$	-1078.77	-1210.00	440.16°
$RbBPh_4$	-1085.01	-1217.62	444.76°
$CsBPh_4$	-1089.26	-1222.66	447.43
$TiBPh_4$	-854.81	-974.34	400.91
$AgBPh_4$	-768.13	-899.90	441.91

notes: S_f^0 see [3].

讨 论

从表 4 中 $-\Delta H_R^0$ 的数据看: $NH_4BPh_4 < KBPh_4 < RbBPh_4 < CsBPh_4 < TiBPh_4 < AgBPh_4$ 与这六种阳离子和 BPh_4^- 发生沉淀反应的速度顺序: $NH_4^+ < K^+ < Rb^+ < Cs^+ < Tl^+ < Ag^+$ (4) 有着一致的关系, 并与相应的 $MBPh_4$ 盐的溶解度大小顺序也很一致。我们求得的 ΔS_R^0 的顺序是: $Ag^+ > NH_4^+ > K^+ > Rb^+ > Cs^+ > Tl^+$, 与 Carr (5) 得到的顺序: $NH_4^+ > K^+ > Rb^+ > Cs^+ > Tl^+ > Ag^+$ 不完全一致。这是计算 ΔG_R^0 时所引用的 K_{sp} 的不同造成的。我们的结果与 Bright (6) 得到的 $AgBPh_4$ 沉淀数据吻合。 $MBPh_4$ 的 $-\Delta H_f^0$ 的顺序为 $AgBPh_4 < TiBPh_4 < NH_4BPh_4 < KBPh_4 < RbBPh_4 < CsBPh_4$ 。总体上看, 与阳离子的离子半径有着大致相同的顺序。要本质地揭示这种规律, 应从原子间的键合能力去分析。

参 考 文 献

- (1) 邹立壮, 张忠海, 徐桂端, 屈松生, 高等化学学报, 10(11), (1989).
- (2) Heyrovsky, A., *Analyst.*, 85, 432(1960).
- (3) Davis, T., Stavcley, L.A.K., *Trans. Faraday Soc.*, 53, 19(1957).
- (4) McClure, J.E., Rechitz, G.A., *Anal. Chem.*, 38, 136(1966).
- (5) Carr, P.W., *Thermochim. Acta*, 2, 505(1971).
- (6) Bright, L.L., Jezorek, J.R., *J. Phys. Chem.*, 79, 800(1975).
- (7) Kossini, F.D. et al., Selected Values of Chemical Thermodynamic Properties, N.B.S.C.,

500(1952).

(8) Hartley, K., Pritchard, H.O., Skinner, H.A., *Trans. Faraday Soc.*, 47, 254(1951).

(9) Kertes, A.S., *Solubility Data Series*, Oxford Pergamon Pr., 18 vol.(1981).

STUDIES ON THERMOCHEMISTRY
OF TETRAPHENYLBORATES
II. STANDARD ENTHALPIES OF FORMATION OF
UNIVALENT TETRAPHENYLBORATES

Zhung Zhonghai

(*Hubei Xiaogan Teacher's Speciality School, Xiaogan 432100*)

Zhou Lizhuang

(*Shandong Liaocheng Teacher's College, Liaocheng 252000*)

Xu Guiduan* Qu Songsheng

(*Department of Chemistry, Wuhan University, Wuhan 430072*)

Using precision solution calorimeter constructed in this laboratory, the enthalpies of reaction of seven precipitates of NH_4BPh_4 , KBPh_4 , RbBPh_4 , CsBPh_4 , TlBPh_4 , AgBPh_4 and HgPh_2 had been determined at 298.15 K. Further, the standard enthalpies, entropies and Gibbs free energies of formation of univalent tetraphenylborates had been calculated at 298.15 K.

Keywords: tetraphenylborate thermochemistry reaction enthalpy
standard enthalpy of formation