漆树漆酶的催化氧化作用

IV. 二茂铁及其衍生物的酶促氧化

季立才 王光辉 胡培植 周穗

(武汉大学化学系, 武汉 430072)

关键词: 漆树漆酶 二茂铁 酶促氧化

漆酶是含铜单电子氧化酶, 主要催化邻、对苯二酚(胺)类底物氧化⁽¹⁻²⁾, 它对不溶于水的二茂铁(Fc-H)及其衍生物(Fc-R)的催化氧化未见报道。本文考察了漆树漆酶在磷酸缓冲液-乙二醇丁醚(DGBE)中对Fc-H和15个Fc-R的催化氧化反应。

实验部分

1. 原料和仪器: 竹溪漆树漆酶见文献[1]。Fc-R系实验室合成, 其余试剂为分析纯。主要仪器: 日本岛津UV-240自动记录分光光度计。

2. 实验步骤和方法: 取0.1~1mg Fc-H或Fc-R溶于1.2ml DGBE, 加入0.1mol/l磷酸缓冲液(pH8.0)4.8ml, 混匀后等分为二份, 一份加1.10U竹溪漆酶, 另一份不加(作为空白), 任其自氧化, 分别观察并比较二份溶液颜色和吸收光谱的变化。

结果和讨论

1. 漆酶对Fc-H和Fc-R的催化氧化: Fc-H和Fc-R在酶促催化氧化时的溶液颜色和吸收光谱的变化见表1。Fc-H氧化后溶液颜色变蓝, $\lambda_{617\text{nm}}$ 左右出现 $[\text{Fc-H}]^+$ 离子特征峰, 这与我们用化学法合成的 $[\text{Fc-H}]^+$ 在相同溶液中的颜色和特征峰相符⁽³⁾, 说明Fc-H被氧化成 $[\text{Fc-H}]^+$ 。Fc-R的酶促氧化分以下几种情况: (1) 光谱和溶液颜色都变化且有新峰出现(No.2); (2) 光谱变化、有新峰出现但溶液颜色不变(No.13); (3) 与空白(不加漆酶)自氧化比较, 溶液颜色未变, 但光谱发生明显变化(No.3, 8-12, 14, 15)。以上十一个Fc-R能程度不同的被氧化。(4) 溶液颜色和光谱没有变化, 与空白完全相同, 可视为未被氧化, 包括No.4, 5, 7和16四个Fc-R。No.6的空白自氧化使溶液颜色和吸收光谱都发生变化, 它的酶促氧化不明显。

2. 漆酶催化Fc-H氧化反应机理: 漆酶催化酚类底物氧化时首先从酚接受一个电子, 使漆酶分子中的 Cu^{2+} 还原为 Cu^+ , 酚失去 H^+ , 经活化 O_2 分子的作用, Cu^+ 被氧化为 Cu^{2+} , O_2 被还原为水⁽²⁾。漆酶对Fc-H的催化氧化机理可用下式表示:

这一机理与漆酶对酚类催化氧化有所不同, 酚类酶促氧化时, H^+ 来源于酚本身, 而 $Fc-H$ 酶促氧化时, 没有失去 H^+ , 只是丢失一个电子变为 $[Fc-H]^+$. 因此推测, $Fc-H$ 酶促氧化时, H^+ 可能来源于环境, 即缓冲溶液中的水、 $H_2PO_4^-$ 和 HPO_4^{2-} 离解出来的质子.

表1 漆酶催化 $Fc-H$ 和 $Fc-R$ 氧化时溶液颜色和光谱变化Table 1 Changes of Solution Color and Spectrum in the Laccase-Catalyzed Oxidation of $Fc-H$ and $Fc-R$ (λ_{nm})

No. $Fc-H$ or $Fc-R$	solution color	absorption peaks (λ_{nm})	
		before reaction	after reaction
1 $Fc-H$	yellow $\rightarrow$ blue	441, 326	increase, new 617
2 $Fc-CH_2OH$	yellow $\rightarrow$ blue	424, 320	increase, new 628
3 $Fc-COOH$	colorless $\rightarrow$ colorless	300	increase
4 $Fc-COOCH_3$	yellow $\rightarrow$ yellow	310	no change
5 $Fc-SO_3H \cdot 2H_2O$	yellow $\rightarrow$ yellow	435	no change
6 $Fc-CHO$	yellow $\rightarrow$ red	465, 342	increase
7 $Fc-COCH_3$	pale red $\rightarrow$ pale red	460, 339	no change
8 $Fc-CH_2NEt_2$	colorless $\rightarrow$ colorless	423, 248	increase
9 $Fc-CH_2NBu_2$	colorless $\rightarrow$ colorless	247	increase
10 $Fc-CH_2N(cycloC_6H_{11})_2$	colorless $\rightarrow$ colorless	248	increase
11 $Fc-CH_2Fc$	yellow $\rightarrow$ yellow	242	increase
12 $Fc-HgFc$	yellow $\rightarrow$ yellow	250	decrease
13 $Fc-CMe_2Fc$	yellow $\rightarrow$ yellow	228	increase, new 251
14 $Fc-CMe_2Fc \cdot 2DDQ$	yellow $\rightarrow$ yellow	429	decrease
15 $Fc-CMe_2Fc \cdot B_{12}H_{12}$	colorless $\rightarrow$ colorless	257	increase
16 $Fc-Hg_2Fc$	yellow $\rightarrow$ yellow	260	no change

参 考 文 献

- (1) 季立才、王光辉、彭庆军, 武汉大学学报 (自然科学版), 4, 63 (1988).
- (2) Holwerda, R.A., Gray, H.B., *J. Am. Chem. Soc.*, 96, 6008 (1974).
- (3) Hendrickson, D.N., Sohn, Y.S., Gray, H.B., *Inorg. Chem.*, 10(8), 1559 (1971).

CATALYZED OXIDATION BY RHUS VERNICIFERA LACCASE

IV. ENZYME-CATALYZED OXIDATION OF FERROCENE AND ITS DERIVATIVES

Ji Licai Wang Guanghui Hu Peizhi Zhou Sui

(Department of Chemistry, Wuhan University, Wuhan, 430072)

In phosphate buffer-diethylene glycol monobutyl ether(DGBE), the oxidations of ferrocene and 15 derivatives were investigated in the presence of *Rhus vernicifera* laccase. The results showed that ferrocene and 11 derivatives can be oxidized. The mechanism of Laccase catalyzed oxidation of ferrocene was put forward.

Keywords: *Rhus vernicifera* laccase ferrocene enzyme-catalyzed oxidation