硝酸铕与二甲基甲酰胺配合物的研究

杨秉勤 杨旭武 高胜利*

(西北大学化学系, 西安 710069)

关键词: 硝酸铕 二甲基甲酰胺 燃烧能

实验部分

一、配合物合成及溶解性

配合物按文献[1]的方法合成, 为微红色粉末, 易溶于水、DMF、DMSO、乙醚、甲醇、乙醇、丙酮、氯仿, 不溶于甲苯、二甲苯、 CCl_4 。

二、分析方法及实验条件

分析方法和实验条件同文献[1]; 燃烧能的测定仪器、实验条件, 量热计当量计算和热交换校正, 燃烧焓的换算和生成热的计算同文献[2]。

结果与讨论

一、配合物的性质

1. 组成分析 元素分析实验值 (%): Eu 27.26, C 20.07, H 3.76, N 14.85; 计算值 (%): Eu 27.27, C 19.40, H 3.80, N 15.08。

2. 熔点及 X-射线粉末衍射分析 配合物熔点为 $102.0\sim 102.5^\circ\text{C}$; 配合物及硝酸铕水合物的 X-射线粉末衍射主要峰值见下表: 从中可以看出配合物为一种新的物相。

3. 红外光谱 图 1 为配合物、配体及硝酸铕的红外光谱, 可以看出: b 曲线中 OH 的吸收消失, 出现 DMF 的第一吸收 (1653cm^{-1}), NO_3^- 的特征吸收由 a 曲线中的 1048cm^{-1} 和 755cm^{-1} 移至 1030cm^{-1} 和 742cm^{-1} , 说明配体 DMF 取代了水合物中的结晶水; b 曲线在 1653cm^{-1} 出现较强的 C=O 伸缩振动吸收, 比 c 曲线中 C=O (1666cm^{-1}) 的吸收向低波数位移了 13cm^{-1} , 可以认为配体 DMF 是以 C=O 中氧原子与 Eu 成键。

4. 热分析 图 2 为配合物的 TG-DTG 图 (升温速率 $10^\circ\text{C}\cdot\text{min}^{-1}$)。从图中看出, TG 曲线所得的失重数据和计算值比较接近。同时对中间产物的 IR 分析表明 EuONO_3 的谱图在 1200cm^{-1} 附近出现较强吸收峰, 与文献[3]一致, Eu_2O_3 的谱图与标准图一致, 说明配合物的

Eu_2O_3

本文于1990年6月30日收到。
国家自然科学基金资助课题。

* 通讯联系人。

改变升温速率对分解过程无明显影响。利用 Kissinger 法求得两个分解过程的表现活化能
见分解过程箭头下方数据。

Eu(NO ₃) ₃ (DMF) ₃		
2θ, °	d, nm	I/I°, %
11.32	7.810	100
12.32	7.178	82
13.12	6.742	18
17.68	5.012	46
19.70	4.502	27
20.92	4.242	30
21.04	4.219	31
31.94	2.752	22
Eu(NO ₃) ₃ · 5H ₂ O		
10.54	8.386	100
11.02	8.022	29
15.40	5.749	78
16.86	5.254	58
20.40	4.349	39
27.74	3.213	36
34.26	2.615	28
42.52	2.124	30

图1 Eu(NO₃)₃ · 5H₂O(a),
Eu(NO₃)₃(DMF)₃ (b)
和 DMF(c) 的 IR

Fig.1 IR spectra of Eu(NO₃)₃ · 5H₂O(a),
Eu(NO₃)₃(DMF)₃ (b)
and DMF (c)

图2 Eu(NO₃)₃(DMF)₃ 的热分解曲线
Fig.2 Thermolysis curves of
Eu(NO₃)₃(DMF)₃

二、配合物的燃烧能

表1 $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3(\text{DMF})_3$ 的燃烧能实验结果Table 1 Combustion Energy of $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3(\text{DMF})_3$

No.	sample weight m(g)	corrected T(°C)	corrected heat value of HNO $g_N(\text{J})$	corrected value of combustion wire $g_C(\text{J})$	combustion energy $-\Delta_c U(\text{J} \cdot \text{g}^{-1})$
1	0.9285	0.52347	23.92	16.60	10062.74
2	0.9785	0.55426	24.86	10.80	9930.69
3	0.9492	0.53458	23.92	12.60	9959.90
4	0.9603	0.54407	23.92	11.70	10057.99
5	0.9558	0.54147	26.43	12.60	9984.91
6	0.9554	0.53472	23.29	12.60	9790.67

试样重量经浮力校正到真空下重量, 燃烧能测定结果见表1. 用文献[2]的方法处理得配合物的燃烧能:

$\Delta_c \bar{U} = -10084.44 \pm 20.06 \text{ J} \cdot \text{g}^{-1}$ 用公式 $\Delta_c H^\ominus = \Delta_c U \pm \Delta nRT$ 可换算得试样标准燃烧焓: $\Delta_c H^\ominus = -5612.19 \pm 11.16 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$, $\Delta_c H^\ominus$ 是指在 298.15K 和 101.325kPa 下, 下列理想燃烧反应的热焓:

用 Hess 定律计算试样的标准生成焓: $\Delta_f H^\ominus = -1761.98(\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$.

参 考 文 献

- [1] 高胜利、杨秉勤、贾婴琦、马怀让, 稀土, 10(5), 26(1989).
- [2] 高胜利、杨旭武、杨秉勤、马怀让, 中国稀土学报, 8(4), 362(1990).
- [3] Bungli, G., Jean-Claude, *Helv. Chim. Acta*, 61(2), 62(1978).

STUDY ON COMPLEX OF EUROPIUM NITRATE WITH DMF

Yang Bingqin Yang Xuwu Gao Shengli

(Department of Chemistry, Northwest University, Xian 710069)

The solid complex $\text{Eu}(\text{NO}_3)_3(\text{DMF})_3$ was prepared. It's IR, X-ray diffraction and thermoanalysis was also studied. The combustion energy was determined to be $-10084.44 \pm 20.06 \text{ J/g}$, with a rotating-bomb calorimeter. The standard enthalpy of combustion and formation were calculated.

Keywords: europium nitrate dimethyl formamide combustion energy