研究简报

二硫代草酰胺和二环己酮草酰二脒桥 联的双核 Cu(II)-Cu(II) 配合物的合成和磁性 I.

倪行 包建春 孙岳明^a 蔡称心

(南京师范大学化学系, 南京 210097) (^a 东南大学化工系, 南京 210018)

关键词: 双核铜配合物 磁性 二硫代草酰胺 二环己酮草酰二脒

在众多桥联配体中, 二硫代草酰胺有独特的性质, 其衍生物与各种金属形成单核或多核配合物已有较多报道, 但以二硫代草酰胺(H₂dto)作桥联基的双核铜配合物的合成报道仍较少^[1]。本文以 H₂dto 作桥联基, 乙二胺(en)或二乙烯三胺(dien)作端接配体, 合成了两个新的双核配合物[Cu₂(en)₂(dto)](CD₄)₂·3H₂O (1) 和[Cu₂(dien)₂(dto)](CD₄)₂·2H₂O (2), 另外用二环己酮草酰二脒(BCO)作桥联基, 以2,2'-联吡啶作端接配体, 合成了一个新型草酰胺类双核铜配合物[Cu₂(bipy)₂(BCO)](CD₄)₂ (3), 研究了它们的光谱及自旋磁交换作用, 发现这三个配合物均具有较弱的反铁磁相互作用。

实 验 部 分

一. 试剂

Cu(CD₄)₂·6H₂O 按文献方法合成^[2], 2,2'-联吡啶、乙二胺、二乙烯三胺、N,N'-二环己酮草酰二脒、二硫代草酰胺均为市售分析纯。

二. 配合物[Cu₂(en)₂(dto)](CD₄)₂·3H₂O (1) 的合成

将371 mg (1 mmol) Cu(CD₄)₂·6H₂O 和61 mg (1 mmol) en 于10 ml 无水甲醇中混合, 溶液即变为蓝色, 室温搅拌2 h 后加入溶解有60 mg (0.5 mmol) H₂dto 的15 ml 无水甲醇溶液, 加热回流2 h, 溶液由蓝色变为绿色, 最后变为黑色, 冷至室温后过滤, 用少量无水甲醇洗涤, 真空干燥得黑色固体 C₆H₂₄Cl₂Cu₂N₆O₁₁S₂。元素分析(%) 计算值: C 11.65, H 3.91, N 13.59, Cu 20.55; 测定值: C 11.51, H 4.34, N 13.26, Cu 21.00。

三. 配合物[Cu₂(dien)₂(dto)](CD₄)₂·2H₂O (2) 的合成

除了使用103 mg (1 mmol) dien 代替 en, 其他过程均与配合物(1)的制备方法相同, 结果得黑色固体 C₁₀H₃₂Cl₂Cu₂N₈O₁₀S₂, 元素分析(%) 计算值: C 17.50, H 4.7, N 16.32, Cu 18.51; 测定值: C 17.73, H 4.19, N 15.97, Cu 18.04。

* 收稿日期: 1995-07-31。

江苏省教委自然科学基金资助课题。

* 通讯联系人及第一作者: 倪行, 女, 58岁, 副教授, 研究方向: 结构化学。

四. 配合物 $[\text{Cu}_2(\text{bipy})_2(\text{BCO})(\text{CD}_4)_2](\text{CD}_4)_2(3)$ 的合成

将156 mg (1 mmol) bipy, 371 mg (1 mmol) $\text{Cu}(\text{CD}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和140 mg (0.5 mmol) BCO 分别用少量乙醇溶解后混合, 搅拌, 加热回流2 h, 溶液由淡蓝色变为黄绿色, 最后呈绿色, 冷至室温后过滤, 用少量乙醇洗涤, 真空干燥, 得绿色固体 $\text{C}_{34}\text{H}_{38}\text{Cl}_4\text{Cu}_2\text{N}_8\text{O}_{18}$, 元素分析 (%) 计算值: C 36.61, H 3.43, N 10.04, Cu 11.39; 测定值: C 36.21, H 2.94, N 9.74, Cu 11.16.

五. 测试方法

元素分析用 Perkin-Elmer 240元素分析仪, 铜含量测定用等离子体光谱法, 红外光谱用 R-408型红外光谱仪(KBr 压片), 固体反射电子光谱用岛津UV-240型电子光谱仪, 热分析用 Perkin-Elmer TGA 7型热分析仪, 变温磁化率采用 CF-提拉样品磁强计测定, 有效磁矩采用公式 $\mu_{\text{eff}} = 2.828(\chi T)^{1/2}$ 计算, 反磁部分用 Pascals 常数校正.

结 果 和 讨 论

一. 配合物组成及构型的推定

元素及热重分析表明, 将 $\text{Cu}(\text{CD}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 与 en 和 H_2dto 或 $\text{Cu}(\text{CD}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 与 dien 和 H_2dto 在无水甲醇中加热回流可分别得到新的双核铜配合物(1)和(2); 而将 $\text{Cu}(\text{CD}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 与 bipy 和二环己酮草酰二脲反应, 得到了配体仍保持中性的配合物(3), 即BCO 中的氮原子用孤对电子同 Cu^{2+} 配位成键, 这与文献^[3]不同, 这种新型组成的双核配合物的合成未见文献报道. 由红外光谱可知, 当形成双核配合物(1)和(2)后, 原来 H_2dto 在1585、1425和840 cm^{-1} 处的二硫代酰胺吸收峰分别移至1505、1440和825 cm^{-1} (配合物1)和1510、1450和810 cm^{-1} (配合物2), 这是由于 H_2dto 中硫和氮分别与 $\text{Cu}(\text{II})$ 配位所致^[4]. 配合物(1)在1610 cm^{-1} 和配合物(2)在1605 cm^{-1} 的谱带分别属于 en 和 dien 的骨架振动吸收峰^[5]. 配合物(1)和(2)在1100 cm^{-1} 处的强吸收峰表明 CD_4^- 离子未参与配位. 此外, 这两个配合物在3300 cm^{-1} 附近均有一宽峰, 它可归结于结晶水的特征频率. 热重分析也表明配合物(1)在115~145 范围内失水, 理论含水量为8.74%, 由热重曲线得到的为8.66%, 配合物(2)在85~120 范围内失水, 理论含水量5.79%, 由热重曲线得到的为5.78%, 表明配合物(1)和(2)分别含三分子和二分子结晶水. 对于配合物(3), 当BCO 作为桥基与 Cu^{2+} 配位后, 其草酰胺骨架振动吸收峰分别由1640、1680和1450 cm^{-1} 移至1600和1460处, 值得注意的是该配合物在1100 cm^{-1} 附近出现三个靠得很近的强吸收峰(1140、1100和1080 cm^{-1}), 这表明配合物中存在以单齿参与配位的 CD_4^- 和未参与配位的 CD_4^- 两种状态^[6,7], 该配合物的摩尔电导值为175 $\text{S} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ (DMF 溶液), 表明配合物为1·2型电解质, 两个 CD_4^- 处在界外.

三种配合物的固体反射电子光谱中分别出现如下吸收带: 14.2 $\times 10^3$ 、25.6 $\times 10^3$ cm^{-1} (1), 14.9 $\times 10^3$ 、23.8 $\times 10^3$ cm^{-1} (2)和14.9 $\times 10^3$ 、24.7 $\times 10^3$ 、31.2 $\times 10^3$ cm^{-1} (3), 其中14.2 $\times 10^3$ cm^{-1} 和14.9 $\times 10^3$ cm^{-1} 的吸收带应归结为 $\text{Cu}(\text{II})$ 的 $d-d$ 跃迁, 其余的四个吸收带可归属于荷移吸收带, 在近紫外区(24-30 KK) 出现明显的吸收带暗示着配合物中金属离子间存在反铁磁相互作用^[9], 综上所述以及根据类似的单晶结构^[1,3], 初步推断配合物(1)、(2)、(3)的可能结构如图1所示.

图1 配合物(1)、(2)和(3)的结构

(N N N 和N N 分别表示二乙烯三胺和乙二胺)

Fig 1 Structure of complexes (1), (2) and (3)

(N N N and N N denote dien and bipy, respectively)

二. 配合物的自旋磁交换作用

三个配合物的变温磁化率(4~ 300 K)已测, 并采用有效磁矩 $\mu_{\text{eff}} = \sqrt{2.828(\chi T)^{1/2}}$ 公式计算, 利用表示两顺磁性离子的相互作用的自旋 Hamiltonian 算符为: $H = - 2J S_1 S_2$ 对数据进行理论分析, 对于双核铜配合物, $S_1 = S_2 = \frac{1}{2}$, 其体系的理论磁化率方程为: $\chi_m = (2N g^2 \mu_B^2 / kT) [3 + \exp(- 2J/kT)]^{-1} + N \alpha$, 式中 χ_m 为每个双核铜分子的摩尔磁化率; $N \alpha$ 是与温度无关的顺磁磁化率; J 表示分子内顺磁离子间相互作用的磁参数。将理论模型与变温磁化率实验数据用最小二乘法进行拟合(图2), 得到磁参数为: 配合物(1): $J = - 0.462 \text{ cm}^{-1}$, $g = 1.92$, $\theta = - 7.6261^*$, $F = 5.4 \times 10^{-4}$; 配合物(2): $J = - 1.03 \text{ cm}^{-1}$, $g = 1.93$, $F = 6.0 \times 10^{-4}$; 配合物(3): $J = - 6.86 \text{ cm}^{-1}$, $g = 2.31$, $F = 1.9 \times 10^{-4}$ 。因为 $J < 0$, 表明三个配合物中 Cu(II) - Cu(II) 间均存在反铁磁自旋磁交换作用, 且这种作用都很弱。

图2 配合物(1)、(2)和(3)的变温磁化率(a)和磁矩(b)

Fig 2 Susceptibility (a) and magnetic moment (b) vs temperature for complexes (1), (2) and (3)

* 磁化率用改进的布利尼—鲍尔斯方程

$\chi_m = [2N g^2 \mu_B^2 / k(T - \theta)] \cdot [1 + \frac{1}{3} \exp(- 2J/kT)]^{-1}$, θ 表示双核单元间磁交换作用校正项, $\theta < 0$ 为反铁磁性相互作用。

图3 配合物(3)的循环伏安曲线

Fig 3 Cyclic voltammogram of complex (3)

三. 配合物(3)的电化学特性

电化学实验在M 270电化学分析系统上进行, 溶剂DMF, 支持电解质 $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{ Bu}_4\text{NCD}_4$

配合物(3)在玻碳电极上的循环伏安曲线如图3所示。图中表明, 配合物(3)的电化学反应在0.6~0.3的电位范围内出现一对准可逆的氧化还原峰。氧化还原峰电位分别为 $E_{pc} = 0.01 \text{ V}$, $E_{pa} = 0.134 \text{ V}$ (vs sec), 峰电位差 ΔE_p 为120 mV; 式量电位 $E^0 = (E_{pc} + E_{pa})/2$ 为0.7 V, 根据文献^[1], 图3中氧化还原峰可归结为由 $\text{Cu}_2^{\text{II}} \rightleftharpoons \text{Cu}^{\text{I}}\text{Cu}^{\text{II}}$ 的电极反应而

产生的。进一步的实验表明, 峰电位差 ΔE_p 随扫速的增加而变大, 且氧化还原峰电流与扫速 $v^{1/2}$ 之间有线性关系(10~150 mV/s), 这说明电极反应是受扩散控制的。

参 考 文 献

- [1] Okawa, H., Matsumoto, N., Koikawa, M. et al, *J. Chem. Soc Dalton Trans*, 1383(1990).
- [2] 安家驹, 陈之川, 无机化合物合成手册, 第二卷, 513(1986).
- [3] Bencini, A., Benelli, C., Gatteschi, D. et al, *Inorg. Chim. Acta*, 86, 169(1984).
- [4] Desseyn, H O., Jacob, W. A., Hemman, M. A., *Spectrochim. Acta, Part A*, 25, 1685(1969).
- [5] 廖代正, 张智勇, 王耕霖, *无机化学学报*, 2, 193(1990).
- [6] Hathaway, B J., Underhill, A E., *J. Chem. Soc*, 3091(1961).
- [7] Foley, J., Kennefick, D., Hathaway, B J., *J. Chem. Soc Dalton Trans*, 2333(1983).
- [8] Bhattacharya, P. K., *Indian Chem. Soc*, 59, 505(1982).
- [9] Nishida, Y., Kida, S., *J. Inorg Nucl Chem.*, 38, 451(1976).

SYNTHESIS AND MAGNETISM OF NEW BINUCLEAR Cu(II)-Cu(II) COMPLEXES BRIDGED BY DITHIO-OXAMDATE OR BISCYCLOHEXANONE OXALYLDIHYDRAZONE GROUP I.

Ni Xing Bao Jianchun Sun Yueming* Cai Chenxin

(Department of Chemistry, Nanjing Normal University, Nanjing 210097)

(*Department of Chemical Engineering, Southeast University, Nanjing 210018)

Three new binuclear copper (II) complexes bridged by dithio-oxamate (dto) group or biscyclohexanone oxalyldihydrazone (BCO) $[\text{Cu}_2(\text{en})_2(\text{dto})](\text{CD}_4)_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ (1), $[\text{Cu}_2(\text{dien})_2(\text{dto})](\text{CD}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (2) and $[\text{Cu}_2(\text{bipy})_2(\text{BCO})(\text{CD}_4)_2](\text{CD}_4)_2$ (3), where en, bipy and dien denote ethylenediamine, 2,2'-bipyridyl and diethylenetriamine respectively, were synthesized and characterized by elemental analysis, IR, electronic spectra and variable temperature magnetic susceptibility. Variable temperature (40-300 K) magnetic susceptibility data for the complexes show that there exists the antiferromagnetic exchange interaction between the two copper (II) ions with J (cm^{-1}) values of -0.462 (1), -1.03 (2) and -6.86 (3). The preliminary study of the electrochemical characteristics of complex (3) was also carried out.

Keywords: binuclear copper (II) complex magnetism dithiooxamate
biscyclohexanone oxalyldihydrazone