②67-674

研究简报

R978.1
O614.33LaCl₃-FuH-H₂O 三元体系 50℃ 相平衡及
[La(H₂O)₃(FuH)₄]Cl₃ · 4H₂O 的合成与表征

张 通 · 黄国强 刘声普 王 丽

(内蒙古工业大学化学工程系, 呼和浩特 010062)

三元系

关键词: 相图 氯化镧 氟脲嘧啶 镧配合物
分类号: O645.12 O614.33 O641.4

相平衡

氟脲嘧啶(Fluorouracil, FuH)是常用代谢类抗癌药,但毒性稍大。某些稀土化合物能通过干扰癌细胞遗传基因达到抗癌作用,且毒性很低。稀土与FuH的配合物中稀土离子与配体产生协同作用,使配合物具有更好的选择性,并且毒性低而药效强^[1]。因此研究稀土化合物与FuH的配合物有现实意义。曾研究过的有关配合物有:过渡元素-FuH^[2]、Pr³⁺-FuH^[3]、Nd³⁺-FuH^[4]、稀土-邻菲罗啉-FuH^[5]。除过渡元素外,其他均在非水溶剂中,在水溶液中合成La³⁺-FuH配合物未见报道。采用高浓度FuH溶液可合成配合物,但理论上难以推知合适的浓度值,相平衡法能从全浓度范围探知合成配合物的条件。本文采用恒温溶解度法测定50℃时LaCl₃-FuH-H₂O三元体系的溶解度数据,根据溶解度数据合成出分子为[La(H₂O)₃(FuH)₄]Cl₃ · 4H₂O的配合物,并对其进行表征。

1 实 验

1.1 试剂和仪器

LaCl₃ · 7H₂O由La₂O₃(99.9%)与稍过量盐酸反应后重结晶制得,FuH(99.7%)为江苏南通制药总厂产品,其余试剂为分析纯。实验中使用的主要仪器有美国Perkin-Elmer 2400元素分析仪,日本岛津DT-40热分析仪(Ar气流、10℃/分升温、10~410℃、α-Al₂O₃参比)、美国PE-1730型FT-IR光谱仪(KBr压片、中红外、分辨率4 cm⁻¹)、日本D/Max-3B X-射线衍射仪(Cu靶、管压40 kV、管流100 mA)。

1.2 分析方法

La³⁺用EDTA配合滴定,Cl⁻用AgNO₃电位滴定,FuH用分光光度法(凯氏定氮法校核),氟元素由氧瓶燃烧-氟离子选择电极双标准法测定,C、H、N用元素分析仪测定。

收稿日期:1998-10-16。 收修改稿日期:1999-01-29。

国家自然科学基金资助项目(No. 2946601)。

* 通讯联系人。

第一作者:张 通,男,47岁,副教授;研究方向:流体相平衡。

1.3 实验方法

所有计量仪器均经校正,恒温槽温度为 $50 \pm 0.05 \text{ } ^\circ\text{C}$ 。溶解度数据的测定采用拉点法配点,固液比 $1:3 \sim 1:2$,平衡时间 8 天,取样分析液相和湿渣组成。根据所测溶解度数据按相图中配合物单固相区的复体配点(固液比 $1:3$)后,样品在 $50 \text{ } ^\circ\text{C}$ 恒温槽中经八天转鼓平衡后分离固相产品,经苛性钠干燥器至恒重,供表征用。

2 结果与讨论

2.1 相平衡结果

在 $50 \text{ } ^\circ\text{C}$ 时对 $\text{LaCl}_3\text{-FuH-H}_2\text{O}$ 三元体系进行了相平衡研究,实验共测得 12 组溶解度数据,根据实验数据绘制了该体系相图(图 1)。相图由三条溶解度曲线 FE、EG、GC 构成,相应的三个固相为 FuH 、 $\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 和组成为 $\text{LaCl}_3\text{-(FuH)}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的固液异组成配合物(简称 LaX)。

2.2 配合物的表征

2.2.1 配合物的组成

对所合成的配合物进行了 C、H、N、 La^{3+} 、 Cl^- 及氟元素测定,方法如前述,差减法得 0%。最终确定配合物组成为 $\text{LaCl}_3 \cdot (\text{C}_4\text{H}_3\text{FN}_2\text{O}_2)_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$,其中 $\text{C}_4\text{H}_3\text{FN}_2\text{O}_2$ 即为配体 FuH 。配合物组成分析结果与理论值吻合(见表 1)。

表 1 配合物的元素分析数据

Table 1 Elemental Analysis Data of the Compound

	La%	Cl%	C%	N%	H%	F%	O%
analysis data	15.46	11.99	22.23	12.48	3.07	8.64	26.14
calculated values	15.56	11.93	21.55	12.57	3.94	8.52	26.91

2.2.2 TG-DTA 分析

配合物热谱与配体 FuH 及 $\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 热谱相比有显著差别。首先, FuH 的尖锐溶化峰 ($280 \text{ } ^\circ\text{C}$) 从配合物的热谱中消失,另外在 Ar 气流中仅配合物有肩形放热峰 ($\sim 294 \text{ } ^\circ\text{C}$),显示热稳定性降低。其次, $\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 失水次序是在 $85.9 \text{ } ^\circ\text{C}$ 时失重 19.07% 而成为 $\text{LaCl}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、在 $119.9 \text{ } ^\circ\text{C}$ 时失重 9.649% 成为 $\text{LaCl}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、最后在 $156.8 \text{ } ^\circ\text{C}$ 时失重 4.824% 成为无水 LaCl_3 ; 而配合物是在 $73.9 \text{ } ^\circ\text{C}$ 失重 8.050% 成为 $\text{LaCl}_3(\text{FuH})_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 、在 $104.8 \text{ } ^\circ\text{C}$ 失重 5.932% 失去其余的结晶水。配合物最初失 $4\text{H}_2\text{O}$ 温度区间 ($45 \sim 100 \text{ } ^\circ\text{C}$) 与 $\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 相同,由于温度低它们相对于其余 $3\text{H}_2\text{O}$ 处于外配位层,另外结晶水处于内配位层^[7]。

2.2.3 IR 谱

$\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的 IR 谱中,结晶水的反对称和对称伸缩振动峰 $\nu(\text{O-H})$ 为 $3400 \sim 3168 \text{ cm}^{-1}$,弯曲振动峰 $\delta(\text{O-H})$ 为 1623 cm^{-1} 。配合物结晶水的 $\nu(\text{O-H})$ 为 $3193 \sim 3066 \text{ cm}^{-1}$ 、 $\delta(\text{O-H})$ 为 1667 cm^{-1} ,变动较大,表明配合物与 $\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 的结晶水位置有变化,这与热谱中失水型式

D: $[\text{La}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{FuH})_4]\text{Cl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

K: $\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$

图 1 $50 \text{ } ^\circ\text{C}$ 时的 $\text{LaCl}_3\text{-FuH-H}_2\text{O}$ 三元体系相图

Fig. 1 Phase diagram of $\text{LaCl}_3\text{-FuH-H}_2\text{O}$ system at $50 \text{ } ^\circ\text{C}$

相符。配体 FuH 的特征吸收峰有 $\nu(\text{C-F})$ 、 $\delta(\text{N}^3\text{-H})$ 、 $\delta(\text{N}^1\text{-H})$ 、 $\nu(\text{C}^4=\text{O}+\text{C}=\text{C})$ 、 $\nu(\text{C}^2=\text{O})$, 顺次为 1250^[2]、1428^[2]、1530^[2]、1663^[2]、1727 cm^{-1} ^[2]。在配合物中依次为 1247、1429、1503、1667、1667 cm^{-1} , 其中仅 $\nu(\text{C}^2=\text{O})$ 红移后与 $\nu(\text{C}^4=\text{O}+\text{C}=\text{C})$ 及 $\delta(\text{O-H})$ 重叠, 即 $\text{C}^2=\text{O}$ 的氧原子与 La^{3+} 有成键迹象。常温下 LaCl_3 水溶液易水解, 但从热谱知配合物受热后仅失水而没有发生 La^{3+} 的水解即分解出 HCl , 可推知 Cl^- 在外配合位层。因为固态由定域粒子组成, 除非 H_2O 与 Cl^- 均在内配位层才能使 La^{3+} 水解释放出 HCl 。事实上, 含水稀土氯化物配合物热分解时放出 HCl 分子数目常与处于内配位层 Cl^- 数目相等或有关^[9]。至此可初步推断配合物的可能结构式为 $[\text{La}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{FuH})_4]\text{Cl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 。

2.2.4 ^1H NMR 谱

配体 FuH 与配合物(未计水峰)的 ^1H NMR 谱见表 2。FuH 常以脱质子式 Fu^- 与过渡元素成配合物^[2], 常以中性分子 FuH 与某些稀土成配合物^[13,14]。FuH 有互变异构:

在 FuH 中 $\text{C}^6\text{-H}$ 受相邻质子与 F 偶合分裂为三重峰^[10]; N^1 与 N^3 化学环境相似, 故 $\text{N}^1\text{-H}$ 与 $\text{N}^3\text{-H}$ 峰相近成为“二重峰”, 所以自由 FuH 是酮式, 与 IR 谱相符。配合物 ^1H 谱(未计水峰)基本未变, 说明 FuH 仍以酮式中性分子与 La^{3+} 成键。但有两点变化: 一是 $\text{C}^6\text{-H}$ 峰的分裂现象消失, 这是抗磁性 La^{3+} 与 FuH 成键的佐证; 二是 $\text{N}^1\text{-H}$ 、 $\text{N}^3\text{-H}$ 的化学位移略移向低场, 这是 La^{3+} 与 $\text{C}^2=\text{O}$ 成键后, 使氧原子电子云偏向 La^{3+} , 逐使 N^1 、 N^3 电子屏蔽减弱之故。由于 δ 变化小, 表明成键强度较弱, 这与先期研究相符^[13,14]。

表 2 配体及配合物的 ^1H NMR 化学位移(未计水峰)

Table 2 ^1H NMR Chemical Shifts (δ , ppm) of Ligand and Compound

compounds	$\text{C}^6\text{-H}$	$\text{N}^1\text{-H}$ 、 $\text{N}^3\text{-H}$
FuH	7.6894, 7.7644, 7.8402	10.7240, 11.5134
LaX	7.7667	10.9245, 11.5550

2.2.5 XRD 谱

我们对 $\text{LaCl}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 、 FuH ^[11] 与配合物 LaX 进行了 X 射线粉末衍射分析。比较各自的 XRD 谱中八条最强衍射峰的 d 和 I/I_0 值知, 配合物 LaX 与其它二者的 X 衍射图完全不一样, 表明后者不是前二者的简单叠加, 说明已形成配合物。

3 结 论

在 LaCl_3 、FuH 高浓度水溶液中可合成出 $[\text{La}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{FuH})_4]\text{Cl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ 的配合物。

参 考 文 献

- [1] Williams D. R. *Chem. Rev.*, 1972, 72, 203.
- [2] Michel A. et al *J. Chem. Res., Symp.*, 1985, (1), 24.
- [3] Misra S. N. et al *Indian J. Biochem. Biophys.*, 1990, 27, 284.

- [4] Misra S. N. et al *Bull. Chem. Soc. Jpn.*, 1991, 64(12), 3653.
- [5] LIN Ji-Yun(林纪筠) et al *Zhongguo Xitu Xuebao (J. of the Chinese Rare Earth Society)*, 1996, 14(3), 193.
- [6] GONG Zheng(龚政) et al *Zhongguo Xitu Xuebao (J. of the Chinese Rare Earth Society)*, 1985, 3(2), 13.
- [7] SU Qiang(苏 锵) *Chem. of Rare Earths(稀土化学)*, Zhengzhou: Science and Technology Press of Henan, 1993, 98, 107.
- [8] ZHANG Shu-Liang(张叔良) et al *Infrared Spectral Analysis and New Technology(红外光谱分析与新技术)*, Beijing: China Medical Science and Technology Press, 1993, p149.
- [9] REN De-Hou(任德厚) et al *Wuji Huaxue Xuebao (Chinese. J. Inorg. Chem.)*, 1992, 8(2), 209.

THE PHASE EQUILIBRIUM OF TERNARY SYSTEM $\text{LaCl}_3\text{-FuH-H}_2\text{O}$ AT 50°C AND CHARACTERIZATION OF SYNTHETIC $[\text{La}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{FuH})_4]\text{Cl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$

ZHANG Tong* HUANG Guo-Qiang LIU Sheng-Pu WANG Li

(Chemical Engineering Department of Inner Mongolia Polytechnic University, Hohhot 010062)

The Equilibrium reaction of the ternary system of $\text{LaCl}_3\text{-FuH}$ (Fluorouracil)- H_2O at 50°C has been investigated by the solubility isotherm method. The coordination compound composition is $[\text{La}(\text{H}_2\text{O})_3(\text{FuH})_4]\text{Cl}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$. The properties of this compound have been characterization by elemental analysis, IR, TG-DTA, ^1H NMR, XRD.

Keywords: phase diagram lanthanum chloride fluorouracil
lanthanum coordination compound